


Exercice 2:

$$D = [0, 1] \times [0, 1]$$



$$\begin{aligned} \iint_D \frac{1}{(1+y+x)^2} dx dy &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{(1+y+x)^2} dx dy \\ &= \int_0^1 \left[-(1+y+x)^{-1} \right]_0^1 dy \\ &= \int_0^1 (1+y)^{-1} - (2+y)^{-1} dy \\ &= \left[\ln(1+y) \right]_0^1 - \left[\ln(2+y) \right]_0^1 \\ &= \ln 2 - (\ln 3 - \ln 2) = \ln(4) - \ln(3). \end{aligned}$$

Exercice 3:

$$i) D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \geq 0 \quad x+y \leq 1 \}$$

$$I_1 = \iint_D (x+y) e^{-x} e^{-y} dx dy = \int_0^1 e^{-x} \underbrace{\left(\int_0^{1-x} (x+y) e^{-y} dy \right)}_{= \textcircled{1}} dx$$

$$\textcircled{1} = x \int_0^{1-x} e^{-y} dy + \int_0^{1-x} y e^{-y} dy \quad \begin{array}{l} \text{I-P-P} \\ u=y \quad u \leq 1 \\ v' = e^{-y} \quad v = e^{-y} \end{array}$$

$$= x \left[-e^{-y} \right]_0^{1-x} + \left[-y e^{-y} \right]_0^{1-x} + \int_0^{1-x} e^{-y} dy$$

$$= x \left(-e^{-1+x} + 1 \right) + \left(-(1-x) e^{-1+x} \right) + \left[-e^{-y} \right]_0^{1-x}$$

$$= -x e^{-1+x} + x + 2e^{-1+x} - e^{-1+x} - e^{-1+x} + 1$$

$$= (x+1) - 2e^{-1+x}.$$


$$I_1 = \int_0^1 ((x+1)e^{-x} - 2e^{-1}) dx$$

iPP: $u = (1+x) \quad u' = 1$
 $w = e^{-x} \quad w' = -e^{-x}$

$$= \left[-(x+1)e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx - 2e^{-1}$$

$$= -2e^{-1} + 1 + \underbrace{\left[-e^{-x} \right]_0^1}_{= -e^{-1} + 1} - 2e^{-1} = 2 - 5e^{-1}$$

$$2) D_2 = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \text{ et } 0 \leq x \leq \cos y \right\}$$



$$I_2 = \iint_D x \cos y \, dx \, dy = \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^{\cos y} x \, dx \right) \cos y \, dy$$


$$= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 y}{2} \cos y \, dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2(y)) \cos y \, dy$$

$$= \frac{1}{2} \left(\left[\sin y \right]_0^{\pi/2} - \left[\frac{1}{3} \sin^3 y \right]_0^{\pi/2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$3) D_3 = \left\{ (x,y) \in [0,1]^2 \mid x^2 + y^2 \geq 1 \right\}$$




$$I_3 = \iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2} \, dx \, dy = \int_0^1 x \left(\int_{\sqrt{1-x^2}}^1 y (1+x^2+y^2)^{-1} \, dy \right) dx$$

$$\begin{aligned}
 I_3 &= \frac{1}{2} \int_0^1 x \left[\ln(1+x^2+y^2) \right]_{\sqrt{1-x^2}}^1 dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 x \left(\ln(2+x^2) - \ln(1+x^2+1-x^2) \right) dx \\
 &= \frac{1}{2} \left(\int_0^1 x \ln(2+x^2) dx - \frac{\ln 2}{2} \right)
 \end{aligned}$$

remarque $(u \ln u - u)' = u \ln u$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left[(2+x^2) \ln(2+x^2) - (2+x^2) \right]_0^1 - \frac{\ln 2}{2} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \left(3 \ln(3) - 3 - 2 \ln(2) + 1 - \ln 2 \right) \\
 &= \frac{1}{4} \left(3 \ln(3) - 3 \ln(2) - 1 \right)
 \end{aligned}$$

4) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \text{ et } z \leq \min\{1-x^2, 1-y^2\}\}$






si $|x| < |y|$ alors $1-x^2 > 1-y^2$ ①
 si $|y| < |x|$ alors $1-y^2 > 1-x^2$ ②

$$\begin{aligned}
 \iiint_D z \, dx \, dy \, dz &= \int_0^1 \left(\int_0^y \left(\int_0^{1-y^2} z \, dz \right) dx \right) dy \quad \text{①} \\
 &\quad + \int_0^1 \left(\int_0^x \left(\int_0^{1-x^2} z \, dz \right) dy \right) dx \quad \text{②} \\
 &= \int_0^1 \int_0^y \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{1-y^2} dx \, dy + \int_0^1 \int_0^x \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{1-x^2} dy \, dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 \int_0^y \frac{(1-y^2)^2}{2} dx dy + \int_0^1 \int_0^x \frac{(1-x^2)^2}{2} dy dx \\
&= \int_0^1 y (1-y^2)^2 \frac{dy}{2} + \int_0^1 x (1-x^2)^2 \frac{dx}{2} \\
&= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{6} (1-y^2)^3 \right]_0^1 + \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{6} (1-x^2)^3 \right]_0^1 = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6}.
\end{aligned}$$

Exercice 4 :

$$D = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq x \leq 1 \right\}$$




x 2 "manières" de calculer cette intégrale.

$$\textcircled{1} \iint_D e^{x^2} dx dy = \int_0^1 \left(\int_y^1 e^{x^2} dx \right) dy \quad \rightarrow \text{il faut primitiver } e^{x^2} \text{ ce qui n'aboutit pas.}$$

$$\begin{aligned}
\textcircled{2} \iint_D e^{x^2} dx dy &= \int_0^1 \left(\int_0^x e^{x^2} dy \right) dx \\
&= \int_0^1 x e^{x^2} dx = \left[\frac{1}{2} e^{x^2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} e - \frac{1}{2} 1 = \frac{(e-1)}{2}.
\end{aligned}$$

Exercício 5:

$$D = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0; y \geq 0; z \geq 0; x + y + z \leq 1 \}$$



$$= \{ \text{---} \mid 0 \leq z \leq 1 \text{ ou } (x, y) \in T \}$$

$$\text{ou } T = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0; y \geq 0; x + y \leq 1 \}$$

$$\iiint_D \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3} = \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} \left(\int_0^{1-x-y} (1+x+y+z)^{-3} dz \right) dy \right) dx$$

$$= \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} \left[-\frac{1}{2} (1+x+y+z)^{-2} \right]_{z=0}^{1-x-y} dy \right) dx$$

$$= \int_0^1 \int_0^{1-x} -\frac{1}{8} + \frac{1}{2} (1+x+y)^{-2} dy dx$$

$$= \int_0^1 \left[-\frac{1}{8} y - \frac{1}{2} (1+x+y)^{-1} \right]_{y=0}^{1-x} dx$$


$$= \int_0^1 -\frac{1}{8} (1-x) - \frac{1}{4} + \frac{(1+x)^{-1}}{2} dx$$

$$= -\frac{1}{8} + \left[\frac{x^2}{16} \right]_0^1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \left[\ln(1+x) \right]_0^1$$

$$= -\frac{2}{16} + \frac{1}{16} - \frac{4}{16} + \frac{\ln 2}{2} = -\frac{5}{16} + \frac{\ln 2}{2}$$

Exercice 6,

1^{ère} méthode: Remarque que: $\text{Aire}(D) = 36 - \text{Aire}(T_1) - \text{Aire}(T_2) - \text{Aire}(T_3) - \text{Aire}(C_1)$




$$= 36 - 6 - 2 - 4 - 4$$

$$= 20.$$

2^{ème} méthode: découper la région D en 2 parties:

$$D = D_1 \cup D_2$$



$$\iint_D dx dy = \int_{-3}^{-1} \left(\int_{-\frac{1}{3}x-2}^{x+2} dy \right) dx + \int_{-1}^3 \left(\int_{-\frac{1}{3}x-2}^{\frac{x}{2}+\frac{3}{2}} dy \right) dx$$

$$= \int_{-3}^{-1} x+2 + \frac{1}{3}x+2 dx + \int_{-1}^3 \frac{x}{2} + \frac{3}{2} + \frac{x}{3} + 2 dx$$

$$= \int_{-3}^{-1} \frac{4}{3}x+4 dx + \int_{-1}^3 \frac{5}{6}x+\frac{7}{2} dx = \left[\frac{4}{3} \frac{x^2}{2} + 4x \right]_{-3}^{-1} + \left[\frac{5}{6} \frac{x^2}{2} + \frac{7}{2}x \right]_{-1}^3$$

$$= \underbrace{\frac{4}{3} \times \frac{1}{2} - 4 - \frac{4}{3} \times \frac{9}{2} + 12}_{= 2 = 6} + \underbrace{\frac{5 \times 9}{12} + \frac{21}{2} - \frac{5}{12} + \frac{7}{2}}_{\frac{15}{4} + \frac{42}{4} - \frac{5}{12} + \frac{14}{4}} = 20.$$

Exercice 7:

1) Pour trouver ϕ et $\psi : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ on remarque que:


$$(y+1)^2 - 2|x|(y+1) + (2x^2-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow y+1 = \frac{1}{2} (2|x| \pm 2\sqrt{|x|^2 - (2x^2-1)})$$

$$\Leftrightarrow y = |x| \pm \sqrt{1-x^2} - 1$$

on pose alors $\phi(x) = |x| - 1 + \sqrt{1-x^2}$

$$\psi(x) = |x| - 1 - \sqrt{1-x^2}$$



2) Calcul d'une primitive de $x \mapsto \sqrt{1-x^2}$.

$$\int_0^u \sqrt{1-t^2} dt = \int_0^{A \sin \theta} \sqrt{1-\sin^2 \theta} \cos \theta d\theta = \int_0^{A \sin \theta} \cos^2 \theta d\theta.$$

1^{ère} méthode: Pose $A = \int_0^{A \sin \theta} \cos^2 \theta d\theta$ et faire une IPP.

$$A = \int_0^{A \sin \theta} \cos^2 \theta d\theta = \underbrace{\cos(A \sin \theta)}_{= \sqrt{1-x^2}} \underbrace{\sin(A \sin \theta)}_{= x} + \int_0^{A \sin \theta} \sin^2 \theta d\theta.$$

$$\text{et } 2A = x\sqrt{1-x^2} + \int_0^{A \sin \theta} (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta = x\sqrt{1-x^2} + A \sin \theta$$

$$\therefore A = \frac{1}{2} (x\sqrt{1-x^2} + A \sin \theta)$$

2^{ème} méthode: linéariser le $\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$ et $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$


$$\int_0^{A \sin \theta} \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \left(A \sin \theta + \left[\frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{A \sin \theta} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(A \sin \theta + \frac{1}{2} \sin(2A \sin \theta) \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(A \sin \theta + \sin(A \sin \theta) \cos(A \sin \theta) \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(A \sin \theta + x\sqrt{1-x^2} \right).$$

3) Utiliser le fait que \mathcal{D} est symétrique par rapport à l'axe Oy .



$$\text{Aire}(\mathcal{D}) = 2 \int_0^1 \int_{\varphi(x)}^{\phi(x)} dy dx$$

$$= 2 \int_0^1 \phi(x) - \varphi(x) dx$$


$$= 2 \int_0^1 2\sqrt{1-x^2} dx = \frac{4}{2} \left[x\sqrt{1-x^2} + \text{Arc}(x) \right]_0^1$$

$$= 2 \text{Arc}(1) = \pi$$

Exercice 2: (Intégrale de Gauss)

cf le chapitre sur le espace normé:

1)



$$\frac{1}{2} \| \cdot \|_2 \leq \| \cdot \|_\infty \leq \| \cdot \|_2$$

$$\Rightarrow B_2(0, 2R) \supset B_\infty(0, R) \supset B_2(0, R)$$

$\begin{matrix} D_{2R} & & K_R & & D_R \end{matrix}$

$$\Rightarrow \iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{K_R} e^{-x^2-y^2} dx dy \leq \iint_{D_{2R}} e^{-x^2-y^2} dx dy$$

car $e^{-x^2-y^2} \geq 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^2$.

$$\Rightarrow \iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{R/\sqrt{2}} d\theta \int_0^R r e^{-r^2} dr = \frac{\pi}{2} \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^R = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2})$$

$$\iint_{D_{2R}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2R^2})$$

$$\iint_{K_R} e^{-x^2-y^2} dx dy = \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2$$


théorème de Jordan $\Rightarrow \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)$ existe et

$$\text{vaut } \frac{\pi}{4}$$

$$\text{et on a } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Exercice 8 :

$$1) D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2 \}$$



$$\iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_{\pi}^{2\pi} \int_{\pi}^{2\pi} r \sin r dr d\theta$$

$$= \left(\left[-r \cos r \right]_{\pi}^{2\pi} + \left[\sin r \right]_{\pi}^{2\pi} \right) 2\pi$$

$$= (-2\pi - \pi) 2\pi = -6\pi^2.$$

$$\phi^{-1}(D) = \begin{cases} \pi < r < 2\pi \\ 0 \leq \theta < 2\pi \end{cases}$$

$$\begin{aligned} u &= r & u' &= 1 \\ v &= \sin r & v' &= \cos r \end{aligned}$$

$$2) D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \} \quad a, b > 0.$$

Poser $\begin{cases} x = a r \cos \theta \\ y = b r \sin \theta \end{cases}$

$$\phi: \underbrace{]0, +\infty[\times]0, 2\pi[}_{\mathcal{J}} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(r, \theta) \longmapsto \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$* |\text{Jac}_{\phi}(r, \theta)| = |ab r| = ab r$$

$$* \phi^{-1}(D) = \{ (r, \theta) \in \mathcal{J} \mid 0 \leq r^2 \leq 1 \}$$


$$\iint_D x^2 + y^2 dx dy = ab \int_0^1 \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) r^3 d\theta dr$$

$$= \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \frac{a^2}{2} (\cos 2\theta + 1) + \frac{b^2}{2} (-\cos 2\theta + 1) d\theta \right) ab$$

$$= ab \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \left(\left[\frac{a^2}{2} \left(\frac{1}{2} \sin(2\theta) + \theta \right) \right]_0^{2\pi} + \left[\frac{b^2}{2} \left(\frac{1}{2} \sin(2\theta) + \theta \right) \right]_0^{2\pi} \right)$$

$$= \frac{ab}{4} \left(\frac{a^2}{2} (2\pi) + \frac{b^2}{2} (2\pi) \right) = \frac{ab}{4} (a^2 \pi + b^2 \pi)$$

$$3) \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq h \right\} \quad h > 0.$$



$$\begin{aligned} \iiint_D z \, dx \, dy \, dz &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^h z \, dz \, d\theta \, r \, dr \\ &= \left(\int_0^1 r \, dr \right) \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \left(\int_0^h z \, dz \right) \end{aligned}$$

Coordonnées cylindriques.

$$\phi^{-1}(D) = \begin{cases} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq z \leq h. \end{cases}$$

$$\text{Jac}_\phi(r, \theta, z) = r.$$

$$= \frac{h^2}{2} \times 2\pi \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} h^2.$$

$$4) D = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \right\}$$

Coordonnées sphériques

$$\begin{aligned} \phi:]0, \pi[\times]0, 2\pi[\times]\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[&\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (r, \theta, \varphi) &\longmapsto \begin{pmatrix} r \cos \theta \cos \varphi \\ r \sin \theta \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\times |\text{Jac}_\phi(r, \theta, \varphi)| = r^2 \cos \varphi$$

$$\times \phi^{-1}(D) = \begin{cases} 1 \leq r \leq 2 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2)^\alpha \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\phi^{-1}(D)} r^{2\alpha} \times r^2 \cos \varphi \, dr \, d\theta \, d\varphi$$

$$= \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \left(\int_1^2 r^{2\alpha+2} \, dr \right) \left(\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \varphi \, d\varphi \right)$$


$$= 2\pi \left[\frac{r^{2\alpha+3}}{2\alpha+3} \right]_1^2 \left[\sin \varphi \right]_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$= 2\pi \left(\frac{2^{2\alpha+3}}{2\alpha+3} - \frac{1}{2\alpha+3} \right) \underbrace{\left(\sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} \right)}_{= 2}$$

$$= \frac{4\pi}{2\alpha+3} \left(2^{2\alpha+3} - 1 \right).$$

Exercice 19 : $\begin{cases} 0 < a \leq b, \\ 0 < c \leq d \end{cases}$

$$D = \left\{ ax^2 \leq y \leq bx^2 \text{ et } \frac{c}{x} \leq y \leq \frac{d}{x}, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$



Poser $\begin{cases} u = y/x^2 \\ v = xy \end{cases}$

* changer de variable : $\phi: \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$
 $(x, y) \mapsto (y x^{-2}, xy)$

$$\det \text{Jac}_{\phi^{-1}}(x, y) = \det \begin{pmatrix} y x^{-3} & x^{-2} \\ y & x \end{pmatrix} = -2y x^{-2} - y x^{-2} = -3x^{-2} y^{-1}$$


$$\Leftrightarrow \det \text{Jac}_{\phi}(u, v) = \frac{1}{\det \text{Jac}_{\phi^{-1}}(\phi(u))} = -\frac{1}{3u}$$

* $\phi^{-1}(D) = \left\{ (u, v) \mid a \leq u \leq b \text{ et } c \leq v \leq d \right\}$

$$\iint_D dx dy = \iint_{\phi^{-1}(D)} \frac{du dv}{3|u|} = \left(\int_a^b \frac{du}{3u} \right) \left(\int_c^d dv \right)$$

$$= \frac{1}{3} \left[\ln u \right]_a^b (d - c) = \frac{1}{3} \ln\left(\frac{b}{a}\right) (d - c)$$

Exercice 10 :



2) on passe en coordonnées polaires:

$$\mathcal{D} = \left\{ (r, \theta) \mid 1 \leq r \leq R \text{ et } 0 \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2} \right\}$$

* calcul du centre de gravité: $\frac{1}{\text{Aire}(\mathcal{D})} \left(\iint_{\mathcal{D}} x \, dx \, dy, \iint_{\mathcal{D}} y \, dx \, dy \right)$

$$* \text{Aire}(\mathcal{D}) = \iint_{\mathcal{D}} dx \, dy = \int_1^R \int_0^{3\pi/2} r \, d\theta \, dr = \left(\int_1^R r \, dr \right) \left(\int_0^{3\pi/2} d\theta \right) = \frac{3\pi}{4} (R^2 - 1)$$

$$* \iint_{\mathcal{D}} x \, dx \, dy = \int_1^R \left(\int_0^{3\pi/2} r^2 \cos \theta \, d\theta \right) dr = \left(\int_1^R r^2 \, dr \right) \left(\int_0^{3\pi/2} \cos \theta \, d\theta \right) = -\frac{(R^3 - 1)}{3}$$

$$* \iint_{\mathcal{D}} y \, dx \, dy = \left(\int_1^R r^2 \, dr \right) \left(\int_0^{3\pi/2} r \sin \theta \, d\theta \right) = \frac{R^3 - 1}{3}$$

on a also:

$$(x_G, y_G) = \frac{4}{3\pi(R^2 - 1)} \left(-\frac{R^3 - 1}{3}, \frac{R^3 - 1}{3} \right)$$

$$= \frac{4(R^2 + R + 1)}{9\pi(R + 1)} (-1, 1)$$

3) Le centre de gravité est situé sur $\Delta = \{y = -x\}$ et appartient

$$\text{à } \mathcal{D} \text{ssi } \frac{4(R^2 + R + 1)\sqrt{2}}{9\pi(R + 1)} \geq 1$$

$$\text{ssi } 4\sqrt{2}R^2 + 4\sqrt{2}R + 4\sqrt{2} \geq 9\pi R + 9\pi$$

$$\text{ssi } 4\sqrt{2}R^2 + R(4\sqrt{2} - 9\pi) + (4\sqrt{2} - 9\pi) \geq 0$$



$$\text{ssi } 4\sqrt{2} \left[R^2 + R \left(1 - \frac{9\pi}{4\sqrt{2}} \right) + \left(1 - \frac{9}{4\sqrt{2}} \right) \right] \geq 0$$

$$n \text{ pose } k = 1 - \frac{9\pi}{4\sqrt{2}} \text{ et}$$

$$\text{donc } R > \frac{k + \sqrt{k^2 + 4k}}{2} \approx 4,826617132 \dots$$

Exercice 11 :

1)




$$S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} 4 \leq x^2 + y^2 \leq 25 \\ 0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases} \right\}$$

$$= \left\{ (r, \theta, z) \mid \begin{cases} 2 \leq r \leq 5 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq z \leq r \end{cases} \right\}$$

$$\iiint_S dx dy dz = \int_2^5 \left(\int_0^{2\pi} \left(\int_0^r r dz \right) d\theta \right) dr$$

$$= \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \int_2^5 r^2 dr = 2\pi \left(\frac{5^3}{3} - \frac{2^3}{3} \right)$$

$$= 78\pi$$



$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4 \\ \text{et} \\ 4(x^2 + y^2) + z^2 \leq 64 \end{cases}\}$$

L'intersection du cylindre et de l'ellipsoïde

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ 16 + z^2 = 64 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 4\sqrt{3} \end{cases}$$

utilise la "forme de surface en xy "

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \sqrt{-4(x^2 + y^2) + 64} \geq z \geq -\sqrt{64 - 4(x^2 + y^2)}\}$$

$x, y \in \mathbb{D}$

$$\text{avec } \mathbb{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$$

$$\iiint_S dx dy dz = \iint_{\mathbb{D}} \int_{\sqrt{64 - 4(x^2 + y^2)}}^{\sqrt{64 - 4(x^2 + y^2)}} dz dx dy$$

$$= 2 \iint_{\mathbb{D}} \sqrt{64 - 4(x^2 + y^2)} dx dy$$

$$= 4 \iint_{\mathbb{D}} \sqrt{16 - r^2} r dr d\theta$$

$$= 4 \times 2\pi \times \left[-\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} (16 - r^2)^{3/2} \right]_0^2 = -\frac{8\pi}{3} \left((16 - 4)^{3/2} - 16^{3/2} \right)$$

$$= 8\pi \left(\frac{64}{3} - 8\sqrt{3} \right)$$