

# Notes du cours d'Analyse Numérique Matricielle<sup>1</sup>

Daniele A. Di Pietro

24 janvier 2021

1. Ces notes sont en “version provisoire permanente”, et leur contenu n’est pas peaufiné au niveau demandé par une publication scientifique

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Rappels et compléments d'algèbre linéaire</b>	<b>2</b>
1.1	Quelques définitions	2
1.2	Valeurs et vecteurs propres, rayon spectral déterminant	8
1.3	Noyau et image d'une matrice	10
1.4	Décompositions d'une matrice	10
1.4.1	Matrices diagonalisables	11
1.4.2	Décomposition de Schur	11
1.4.3	Décomposition en valeurs singulières	12
1.5	Normes matricielles	13
1.6	Exercices	17
<b>2</b>	<b>Méthodes directes</b>	<b>25</b>
2.1	Solution numérique des systèmes linéaires	25
2.1.1	Conditionnement d'une matrice	25
2.1.2	Analyse a priori	26
2.2	Opérations élémentaires	28
2.3	Méthode de Gauss	30
2.3.1	Factorisation $A = LU$	30
2.3.2	Existence et unicité de la factorisation $A = LU$	32
2.3.3	<i>Pivoting</i> partiel et factorisation $PA = LU$	34
2.3.4	Résolution de systèmes linéaires	35
2.4	Matrices SDP : La factorisation de Cholesky	36
2.5	Matrices creuses	38
2.5.1	Matrices tridiagonales : La méthode de Thomas	38
2.6	Exercices	40
<b>3</b>	<b>Méthodes itératives</b>	<b>46</b>
3.1	Méthodes de point fixe	46
3.1.1	Formulation abstraite basée sur une décomposition régulière	46
3.1.2	Les méthodes de Jacobi et Gauss–Seidel	49
3.1.3	La méthode du gradient	50
3.2	Méthode du gradient conjugué	53
3.2.1	Vecteurs $A$ -conjugués	53
3.2.2	La méthode du gradient conjugué	54
3.3	Exercices	58

# Chapitre 1

## Rappels et compléments d'algèbre linéaire

### 1.1 Quelques définitions

Soit  $m$  et  $n$  deux entiers positifs et soit  $K$  un corps commutatif. Par la suite seuls les cas  $K = \mathbb{R}$  et  $K = \mathbb{C}$  seront considérés, et les éléments de  $K$  seront de ce fait appelés *scalaires*. Une *matrice* à  $m$  lignes et  $n$  colonnes est un ensemble de  $mn$  scalaires (dits *éléments de la matrice*) indexés par les éléments du produit cartésien  $I \times J$  avec  $I := \llbracket 1, m \rrbracket$  et  $J := \llbracket 1, n \rrbracket$  :  $a_{ij} \in K$ ,  $1 \leq i \leq m$ ,  $1 \leq j \leq n$ . Les indices  $i$  et  $j$  sont dits, respectivement *ligne* et *colonne* de  $a_{ij}$ . En effet, on peut interpréter le couple d'indices  $(i, j)$  comme les coordonnées de l'élément  $a_{ij}$  dans le tableau suivant :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Par la suite on utilisera la notation  $A = (a_{ij})$  pour indiquer que l'élément générique de la matrice  $A$  est noté  $a_{ij}$  (les intervalles  $I$  et  $J$  ne seront précisés si on peut les déduire du contexte). La notation  $(A)_{ij}$  pourra également être utilisée pour indiquer l'élément d'indices  $(i, j)$ . Pour tout  $1 \leq i \leq m$  on définit le *vecteur ligne*  $i$  de  $A$  (noté  $A_{i\cdot}$ ) comme suit :

$$A_{i\cdot} := (a_{i1} \quad a_{i2} \quad \dots \quad a_{in}) \in K^n.$$

De manière analogue, pour tout  $1 \leq j \leq n$  on définit le *vecteur colonne*  $j$  de  $A$  (noté  $A_{\cdot j}$ ) par

$$A_{\cdot j} := \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \in K^m.$$

On peut identifier chaque ligne  $i$  (resp. colonne  $j$ ) de  $A$  avec le vecteur ligne  $A_{i\cdot}$  (resp. vecteur colonne  $A_{\cdot j}$ ) correspondant, et on parlera alors tout simplement de lignes et de colonnes de  $A$ . Une matrice qui a autant de lignes que de colonnes est dite *carrée*. Les matrices non carrées sont dites *rectangulaires*.

**Définition 1.1** (Matrice triangulaire, strictement triangulaire et diagonale). Une matrice  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  est dite triangulaire supérieure (resp. inférieure) si, pour tout  $1 \leq i, j \leq n$ , ( $i > j \implies a_{ij} = 0$ ) (resp. ( $i < j \implies a_{ij} = 0$ )). Si les inégalités strictes sont remplacées par des inégalités simples, on parle alors de matrice strictement triangulaire supérieure (resp. inférieure). Une matrice (strictement) triangulaire inférieure ou supérieure est dite (strictement) triangulaire. La matrice  $A$  est dite diagonale si  $i \neq j \implies a_{ij} = 0$ , pour tout  $1 \leq i, j \leq n$ .

**Exercice 1.2** (Matrice triangulaire, strictement triangulaire et diagonale). Dire si les matrices suivantes sont triangulaires, strictement triangulaires ou diagonales :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Définition 1.3** (Matrice de Hessenberg). Une matrice  $A \in \mathbb{C}^{n+1,n}$  est dite de Hessenberg supérieure si  $i > j + 1 \implies a_{ij} = 0$ .

Par la suite nous omettrons d'indiquer les éléments nuls des matrices triangulaires, diagonales ou de Hessenberg.

**Définition 1.4** (Transposée et transconjugée d'une matrice). Soit  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m,n}$ . On définit la transposée et la transconjugée (ou matrice adjointe) de  $A$  respectivement par

$$A^T := (a_{ji}) \in \mathbb{C}^{n,m}, \quad A^H := (\bar{a}_{ji}) \in \mathbb{C}^{n,m}.$$

**Exemple 1.5** (Transposée et transconjugée). On considère la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 2+3i & 3+4i \\ 1+5i & 3+7i \end{pmatrix}.$$

Sa transposée et transconjugée sont données, respectivement, par

$$A^T = \begin{pmatrix} 2+3i & 1+5i \\ 3+4i & 3+7i \end{pmatrix}, \quad A^H = \begin{pmatrix} 2-3i & 1-5i \\ 3-4i & 3-7i \end{pmatrix}.$$

**Exercice 1.6** (Propriété de la transconjugée). Vérifier que

(i) Pour toutes matrices  $A, B \in \mathbb{C}^{n,m}$ ,

$$(A+B)^H = A^H + B^H; \tag{1.1}$$

(ii) Pour tout scalaire  $\alpha \in \mathbb{C}$  et toute matrice  $A \in \mathbb{C}^{n,m}$ ,

$$(\alpha A)^H = \bar{\alpha} A^H.$$

Soient  $l, m, n \in \mathbb{N}_*$ ,  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n,m}$ ,  $B = (b_{ij}) \in \mathbb{C}^{m,l}$ . On définit le produit matriciel  $AB \in \mathbb{C}^{n,l}$  comme la matrice telle que

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj} \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, l \rrbracket.$$

Le produit matriciel est illustré dans la Figure 1.1.




FIGURE 1.1 – Produit matriciel. Figure adaptée de Alain Matthes, <http://altermundus.com/pages/examples.html>

**Proposition 1.7** (Propriétés du produit matriciel). *Le produit matriciel est (i) associatif, à savoir, pour tout  $A, B$ , et  $C$  pour lesquelles les produits ont un sens, on a  $(AB)C = A(BC) = ABC$ ; (ii) distributif par rapport à addition, à savoir, pour toutes matrices  $A, B, C$  pour lesquelles l'écriture  $A(B + C)$  a un sens on a  $A(B + C) = AB + AC$ .*

Il est important de retenir que le produit matriciel *n'est pas commutatif*.

**Exercice 1.8** (Produit matriciel). *Soient  $A \in \mathbb{R}^{2,3}$  et  $B \in \mathbb{R}^{3,3}$  définies comme suit :*

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B := \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 7 & 3 & 2 \\ 8 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On a

$$AB = \begin{pmatrix} 40 & 12 & 11 \\ 28 & 16 & 9 \end{pmatrix}.$$

*Précisez si les produits  $BA$  et  $BA^T$  sont définis et, si c'est le cas, les calculer.*

**Proposition 1.9** (Produit de deux matrices triangulaires). *Soient  $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$  deux matrices triangulaires inférieures (resp. supérieures). Alors,  $AB$  est triangulaire inférieure (resp. supérieure).*

*Démonstration.* On détaille la preuve pour le cas triangulaire inférieure, l'autre cas pouvant se traiter de manière analogue. Par définition nous avons

$$(i < k \implies a_{ik} = 0) \text{ et } (k < j \implies b_{kj} = 0).$$

Par conséquent,

$$i < j \implies (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^i a_{ik} \underbrace{b_{kj}}_{=0 \text{ car } k \leq i < j} + \sum_{k=i+1}^n \underbrace{a_{ik}}_{=0 \text{ car } i < k} b_{kj} = 0. \quad \square$$

**Exemple 1.10** (Produit de deux matrices triangulaires). *On considère les deux matrices triangulaires inférieures*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 2 & 3 & \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8 & & \\ 2 & 4 & \\ 5 & 9 & 2 \end{pmatrix}.$$

On a

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & & \\ 22 & 12 & \\ 49 & 61 & 10 \end{pmatrix}.$$

La preuve de la proposition suivante est laissée en exercice.

**Proposition 1.11** (Transposé et transconjugué d'un produit). *Pour tout  $A \in \mathbb{C}^{n,m}$  et  $B \in \mathbb{C}^{m,l}$  on a*

$$(AB)^H = B^H A^H, \quad (AB)^T = B^T A^T.$$

**Exercice 1.12** (Transposé et transconjugué d'un produit). *Reprendre les matrices de l'Exercice 1.8 et vérifier que  $(AB)^T = B^T A^T$ .*

**Définition 1.13** (Matrice hermitienne et symétrique). *Une matrice complexe  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  est dite hermitienne si  $A^H = A$ . Une matrice réelle  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  est dite symétrique si  $A^T = A$ .*

**Exemple 1.14** (Matrice hermitienne et symétrique). *Les matrices suivantes sont, respectivement, hermitienne et symétrique.*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1+i & 2+i \\ 1-i & 2 & 3+i \\ 2-i & 3-i & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

*Que peut-on dire des éléments diagonaux d'une matrice hermitienne?*

**Définition 1.15** (Matrice normale, unitaire et orthogonale). *Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$ . On dit que  $A$  est normale si  $AA^H = A^H A$ . Si, de plus,  $AA^H = A^H A = I_n$  on dit que  $A$  est unitaire. Si  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ , on dit que  $A$  est orthogonale si  $AA^T = A^T A = I_n$ .*

Il est utile de rappeler que les produits scalaires canoniques sur  $\mathbb{R}^n$  et  $\mathbb{C}^n$  sont définis, respectivement, par

$$(x, y)_{\mathbb{R}^n} := y^T x, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \quad (x, y)_{\mathbb{C}^n} := y^H x, \quad \forall x, y \in \mathbb{C}^n.$$

Quand le contexte rend la notation non ambiguë, nous allons omettre l'indice pour le produit interne de  $\mathbb{R}^n$ .

**Remarque 1.16** (Matrices unitaires et norme 2). *La dénomination des matrices unitaires se justifie par la remarque suivante. Soit  $\|\cdot\|_2$  la norme vectorielle sur  $\mathbb{C}^n$  définie par  $\|x\|_2^2 := (x, x)_{\mathbb{C}^n} = x^H x$ . Alors, pour toute matrice unitaire  $U \in \mathbb{C}^{n,n}$  et tout vecteur  $x \in \mathbb{C}^n$ ,*

$$\|Ux\|_2^2 = (Ux, Ux)_{\mathbb{C}^n} = (Ux)^H Ux = x^H U^H Ux = x^H x = \|x\|_2^2,$$

*à savoir, la multiplication par une matrice unitaire ne modifie pas la norme d'un vecteur. Plus généralement, pour tout  $x, y \in \mathbb{C}^n$ , on a*

$$(Ux, Uy)_{\mathbb{C}^n} = (Uy)^H Ux = y^H U^H Ux = y^H x = (x, y)_{\mathbb{C}^n},$$

*à savoir, les matrices unitaires préservent le produit scalaire.*

**Exemple 1.17** (Matrice élémentaire unitaire). *Soit  $w \in \mathbb{C}^n$  tel que  $(w, w)_{\mathbb{C}^n} = w^H w = 1$ . On définit*

$$A := I_n - 2ww^H. \tag{1.2}$$

*Une matrice de la forme (1.2) est dite élémentaire. On remarquera que  $A$  est hermitienne. En effet, en utilisant (1.1) suivi par la Proposition 1.11, il vient*

$$A^H = (I_n - 2ww^H)^H = I_n^H - 2(w^H)^H w^H = I_n - 2ww^H = A.$$

On vérifie ensuite que  $A$  est unitaire. En effet,

$$\begin{aligned}
 A^H A &= (I_n - 2w w^H)^H (I_n - 2w w^H) \\
 &= (I_n - 2w w^H)(I_n - 2w w^H) && A \text{ hermitienne} \\
 &= I_n - 4w w^H + 4(w w^H)(w w^H) && \text{Proposition 1.7, distributivité} \\
 &= I_n - 4w w^H + 4w \underbrace{(w^H w)}_{=1} w^H && \text{Proposition 1.7, associativité} \\
 &= I_n - 4w w^H + 4w w^H = I_n.
 \end{aligned}$$

**Définition 1.18** (Inverse d'une matrice). Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$ . On dit que  $A$  est inversible s'il existe  $B \in \mathbb{C}^{n,n}$  telle que  $AB = BA = I_n$ .  $B$  est dit inverse de la matrice  $A$  et elle est notée  $A^{-1}$ .

On vérifie aisément que l'inverse d'une matrice, si elle existe, est unique. Pour s'en convaincre, soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  une matrice inversible et  $B, C \in \mathbb{C}^{n,n}$  deux matrices telles que  $AB = BA = AC = CA = I_n$ . De par la Proposition 1.7 on a

$$AB = BA \implies CAB = CBA \implies (CA)B = C(BA) \implies I_n B = C I_n \implies B = C.$$

Par définition, en outre, toute matrice  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  (resp.  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ ) unitaire (resp. orthogonale) est inversible avec  $A^{-1} = A^H$  (resp.  $A^{-1} = A^T$ ).

Il est utile de considérer l'inverse de la transposée d'une matrice inversible. On a, par définition,

$$I_n = (A^T)^{-1} A^T \iff I_n^T = [(A^T)^{-1} A^T]^T \iff I_n = A [(A^T)^{-1}]^T = A A^{-1},$$

à savoir  $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ . Cette remarque suggère la définition suivante.

**Définition 1.19** (Inverse transposée). Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  inversible. On définit la matrice inverse transposée de  $A$  par  $A^{-T} := (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ .

**Proposition 1.20** (Inverse d'un produit). Pour tout  $A, B \in \mathbb{C}^{n,n}$  inversibles telles que  $AB$  est inversible on a

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}.$$

*Démonstration.* On a que

$$(B^{-1} A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1} I_n B = B^{-1} B = I_n,$$

où nous avons utilisé l'associativité du produit matriciel (voir Proposition 1.7) dans la première égalité. D'autre part, en procédant de façon similaire, on a que

$$(AB)(B^{-1} A^{-1}) = A(B B^{-1})A^{-1} = A I_n A^{-1} = A A^{-1} = I_n.$$

La conclusion s'ensuit par Définition 1.18 de l'inverse. □



## 1.2 Valeurs et vecteurs propres, rayon spectral déterminant

**Définition 1.21** (Valeurs et vecteurs propres). Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$ . Un scalaire  $\lambda \in \mathbb{C}$  est dit valeur propre de  $A$  s'il existe un vecteur  $x \in \mathbb{C}^n$  non nul tel que

$$Ax = \lambda x.$$

On dit dans ce cas que  $x \in \mathbb{C}^n$  est un vecteur propre associé à la valeur propre  $\lambda$ . L'ensemble des valeurs propres d'une matrice  $A$ , noté  $\text{Sp}(A)$ , est dit spectre de  $A$ .

Les valeurs propres sont par définition les solutions de l'équation caractéristique

$$p_A(\lambda) := \det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Comme  $p_A$  est un polynôme de degré  $n$ , il admet précisément  $n$  racines complexes (non nécessairement distinctes).

**Proposition 1.22** (Valeurs propres de l'inverse d'une matrice). Pour toute matrice  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  inversible on a

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \implies \lambda^{-1} \in \text{Sp}(A^{-1}). \quad (1.3)$$

*Démonstration.* On verra plus loin (Théorème 1.33) que l'inversibilité de  $A$  implique que toutes ses valeurs propres sont non nulles. Comme  $\lambda \in \text{Sp}(A)$ , il existe  $x \in \mathbb{C}^n$  non nul tel que

$$Ax = \lambda x \iff x = A^{-1}Ax = \lambda A^{-1}x \iff \lambda^{-1}x = A^{-1}x,$$

ce qui prouve que  $\lambda^{-1} \in \text{Sp}(A^{-1})$ . □

**Définition 1.23** (Matrice HDP et SDP). Une matrice  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  est HDP si elle est hermitienne et définie positive, à savoir,

$$(Ax, x)_{\mathbb{C}^n} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0 \in \mathbb{C}^n\}.$$

Une matrice  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  est SDP si elle est symétrique et définie positive.

**Remarque 1.24** (Matrices définies positives non symétrique). Considérons, par simplicité, le cas de matrices réelles. On peut se poser la question s'il existe des matrices définies positives et non symétriques. Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ . On commence par remarquer que l'on peut décomposer  $A$  en la somme d'une partie symétrique  $A_s$  et une anti-symétrique  $A_{ss}$ ,

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T) := A_s + A_{ss}.$$

Par définition de matrice définie positive on a pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $x \neq 0$ ,

$$0 < (Ax, x) = (A_s x, x) + (A_{ss} x, x). \quad (1.4)$$

On a

$$(A_{ss} x, x) = x^T A_{ss} x = (x^T A_{ss} x)^T = x^T A_{ss}^T x = -x^T A_{ss} x = -(A_{ss} x, x),$$

où nous avons utilisé, respectivement, la définition du produit scalaire de  $\mathbb{R}^n$ , le fait que la transposée d'un scalaire est le scalaire même, la Proposition 1.11 deux fois, le fait que  $A_{ss} = -A_{ss}^T$  (car  $A_{ss}$  est antisymétrique), et encore une fois la définition du produit scalaire de  $\mathbb{R}^n$ . Ceci montre que  $(A_{ss}x, x) = 0$ , à savoir, la partie anti-symétrique d'une matrice ne contribue pas à son caractère défini positif. De plus, on peut déduire de (1.4) qu'une matrice est positive définie si et seulement si sa partie symétrique l'est.

**Exemple 1.25** (Matrice définie positive non symétrique). On considère la matrice  $A \in \mathbb{R}^{2,2}$  suivante

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vérifier que  $A$  est définie positive et montrer que  $\text{Sp}(A) = \{1 - i, 1 + i\}$ . Cet exercice montre, au passage, qu'une matrice définie positive mais non symétrique n'a pas forcément des valeurs propres réelles positives.

**Proposition 1.26** (Valeurs propres d'une matrice HDP/SDP). Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  (resp.  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ ) une matrice HDP (resp. SDP). Alors, toutes les valeurs propres de  $A$  sont réelles et strictement positives.

*Démonstration.* On détaille la preuve uniquement pour le cas HDP, l'autre étant similaire. Soit  $\lambda$  une valeur propre de  $A$  et  $x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0 \in \mathbb{C}^n\}$  un vecteur propre associé. Alors,

$$Ax = \lambda x \implies \mathbb{R}_*^+ \ni x^H Ax = \lambda x^H x = \lambda \|x\|_2^2 \implies \lambda = \frac{x^H Ax}{\|x\|_2^2} \in \mathbb{R}_*^+. \quad \square$$

Nous admettrons le résultat suivant.

**Proposition 1.27** (Valeurs propres d'une matrice triangulaire). Les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont ses éléments diagonaux.

**Définition 1.28** (Rayon spectral). Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$ . On définit son rayon spectral comme la plus grande valeur absolue de ses valeurs propres, à savoir,

$$\rho(A) := \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda|.$$

Le rayon spectral n'est pas une norme matricielle (voir Section 1.5), car on peut avoir  $\rho(A) = 0$  sans que  $A$  soit nulle (il suffit de prendre une matrice triangulaire non nulle avec diagonale nulle pour s'en convaincre).

**Définition 1.29** (Déterminant). Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$ . Le déterminant de  $A$  est donné par

$$\det(A) := \prod_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \lambda.$$

Le déterminant d'une matrice permet de décider de son inversibilité. Plus précisément, une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. De par la Proposition 1.22 on a, en outre, que

$$\det(A^{-1}) = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(A^{-1})} \lambda = \prod_{\tilde{\lambda} \in \text{Sp}(A)} \frac{1}{\tilde{\lambda}} = \frac{1}{\det(A)}.$$

### 1.3 Noyau et image d'une matrice

Soit  $A \in \mathbb{R}^{m,n}$  et  $\mathcal{C}_A$  le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^m$  engendré par ses colonnes,

$$\mathcal{C}_A := \text{span}(A_{\cdot,j})_{1 \leq j \leq n}.$$

L'image de  $A$  est le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^m$  défini par

$$\text{range}(A) := \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\} \subset \mathbb{R}^m.$$

Le noyau de  $A$  est la préimage du vecteur nul de  $\mathbb{R}^m$  par l'application linéaire associée à  $A$ ,

$$\ker(A) := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0 \in \mathbb{R}^m\} \in \mathbb{R}^n.$$

**Proposition 1.30** (Image d'une matrice). *On a  $\mathcal{C}_A = \text{range}(A)$ .*

*Démonstration.* Il suffit de remarquer que le résultat de la multiplication (à droite) d'une matrice  $A \in \mathbb{R}^{m,n}$  par un vecteur  $x \in \mathbb{R}^n$  est la combinaison linéaire des colonnes de la matrice avec coefficients donnés par les composantes de  $x$ ,

$$\left( (Ax)_i = \sum_{j=1}^n A_{ij} x_j \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket \right) \iff Ax = \sum_{j=1}^n A_{\cdot,j} x_j. \quad \square$$

**Définition 1.31** (Rang d'une matrice). *On définit le rang d'une matrice comme la dimension de son image,*

$$\text{rank}(A) := \dim(\text{range}(A)).$$

**Proposition 1.32** (Propriétés du rang d'une matrice). *Soit  $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ . Nous avons  $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$  et*

$$\text{rank}(A) + \dim(\ker(A)) = n.$$

Le résultat suivant, que l'on admettra, établit un lien entre le déterminant, le rang, et le noyau d'une matrice et son inversibilité.

**Théorème 1.33** (Caractérisation des matrices inversibles). *Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ . Les propriétés suivantes sont équivalentes : (i)  $A$  est inversible; (ii)  $\det(A) \neq 0$ ; (iii)  $\ker(A) = \{0 \in \mathbb{R}^n\}$ ; (iv)  $\text{rank}(A) = n$ ; (v) les colonnes et les lignes de  $A$  sont linéairement indépendantes.*

Les résultats de cette section s'étendent sans difficulté au cas de matrices complexes.

### 1.4 Décompositions d'une matrice

Il est souvent utile de décomposer une matrice en un produit de matrices ayant des propriétés favorables. Dans cette section nous allons rappeler quelques décompositions importantes dans les applications numériques.

### 1.4.1 Matrices diagonalisables

**Définition 1.34** (Matrice diagonalisable). *Une matrice  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  est diagonalisable s'il existe une matrice  $Q \in \mathbb{C}^{n,n}$  inversible telle que  $A = Q^{-1}\Lambda Q$  avec  $\Lambda \in \mathbb{C}^{n,n}$  matrice diagonale.*

**Proposition 1.35** (Valeurs et vecteurs propres d'une matrice diagonalisable). *Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  une matrice diagonalisable. Alors, en reprenant la notation de la Définition 1.34,  $\Lambda$  contient les valeurs propres de  $A$  et les colonnes de  $Q^{-1}$  sont des vecteurs propres associés.*

*Démonstration.* En multipliant à droite par  $Q^{-1}$  la relation  $A = Q^{-1}\Lambda Q$  on obtient  $AQ^{-1} = Q^{-1}\Lambda$ , ou, de façon équivalente,

$$AQ_{:j}^{-1} = Q^{-1}\Lambda_{:j} = \lambda_j Q_{:j}^{-1} \quad \forall 1 \leq j \leq n,$$

où nous avons noté  $Q_{:j}^{-1}$  la  $j$ -ème colonne de  $Q^{-1}$  et  $\lambda_j = (\Lambda)_{jj}$ . □

La Proposition 1.35 suggère le résultat suivant, que nous admettrons.

**Théorème 1.36** (Caractérisation d'une matrice diagonalisable). *Une matrice  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  (resp.  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ ) est diagonalisable si et seulement si on peut construire une base de  $\mathbb{C}^n$  (resp.  $\mathbb{R}^n$ ) formée de vecteurs propres de  $A$ .*

Dans certains cas, on peut prouver des propriétés additionnelles pour la matrice  $Q$  qui apparaît dans la Définition 1.34. Un exemple à retenir est donné dans le lemme suivant, qui affirme que les matrices normales sont les seules matrices unitairement semblables à des matrices diagonales.

**Lemme 1.37** (Diagonalisation d'une matrice normale). *La matrice  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  est normale (c.-à-d.,  $AA^H = A^H A$ ) si et seulement s'il existe une matrice unitaire  $U \in \mathbb{C}^{n,n}$  (c.-à-d.,  $UU^H = U^H U = I_n$ ) telle que*

$$U^{-1}AU = U^H AU = \Lambda := \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

avec  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$  valeurs propres de  $A$ .

### 1.4.2 Décomposition de Schur

Pour une matrice générique, on peut prouver uniquement qu'elle est unitairement semblable à une matrice triangulaire, comme l'affirme le résultat suivant.

**Théorème 1.38** (Décomposition de Schur (DS)). *Pour toute  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  il existe  $U \in \mathbb{C}^{n,n}$  unitaire telle que*

$$U^{-1}AU = U^H AU = \begin{pmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & \lambda_2 & & b_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} =: T,$$

où  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$  sont les valeurs propres de  $A$ .

On pourra remarquer que, si  $T$  est une matrice carrée triangulaire supérieure, sa décomposition de Schur s'obtient en posant  $U = I_n$ . Ceci implique, en particulier, que les valeurs propres de  $T$  sont ses éléments diagonaux. Ce résultat s'applique également aux matrices triangulaires inférieures.

Le corollaire suivant montre une autre conséquence importante de la DS, à savoir, toute matrice hermitienne est diagonalisable.

**Corollaire 1.39** (Valeurs propres et DS des matrices complexes hermitienne et réelles symétriques). *Si la matrice  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  est hermitienne,  $T$  est diagonale,  $\lambda_i \in \mathbb{R}$  pour tout  $1 \leq i \leq n$ , et les colonnes de  $U$  (ou, de manière équivalente, les lignes de  $U^H = U^{-1}$ ) sont des vecteurs propres de  $A$ .*

*D'une même manière, si la matrice  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  est symétrique,  $T$  est diagonale,  $\lambda_i \in \mathbb{R}$  pour tout  $1 \leq i \leq n$ ,  $U$  est à valeurs réelles et orthogonale, et ses colonnes (ou, de manière équivalente, les lignes de  $U^T = U^{-1}$ ) sont des vecteurs propres de  $A$ .*

*Démonstration.* On se limite à prouver le premier point. Comme  $A$  est hermitienne on a

$$T^H = (U^H A U)^H = U^H A^H U = U^H A U = T,$$

ce qui implique  $T = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  et, pour tout  $1 \leq i \leq n$ ,  $\lambda_i = \overline{\lambda_i} \iff \Im(\lambda_i) = 0 \iff \lambda_i \in \mathbb{R}$ . Pour prouver que les lignes de  $U$  sont des vecteurs propres on procède comme dans la preuve de la Proposition 1.35 en observant que  $U^{-1} = U^H$ .  $\square$

### 1.4.3 Décomposition en valeurs singulières

Toute matrice  $A \in \mathbb{C}^{m,n}$  peut être transformée en une matrice diagonale rectangulaire à l'aide de deux matrices unitaires.

**Théorème 1.40** (Décomposition en valeurs singulières (DVS)). *Pour toute  $A \in \mathbb{C}^{m,n}$  il existe deux matrices unitaires  $U \in \mathbb{C}^{m,m}$  et  $V \in \mathbb{C}^{n,n}$  telles que*

$$U^H A V = \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_p) \in \mathbb{R}^{m,n} \quad p := \min(m, n).$$

*Les réels  $0 \leq \sigma_1 \leq \dots \leq \sigma_p$  sont dits valeurs singulières de  $A$ . Si, de plus,  $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ , on a  $U \in \mathbb{R}^{m,m}$  et  $V \in \mathbb{R}^{n,n}$  et on peut écrire  $U^T A V = \Sigma$ .*

**Proposition 1.41** (Caractérisation des valeurs singulières). *Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$ . On a*

$$\sigma_i(A) = \sqrt{\lambda_i(A^H A)} \quad \forall 1 \leq i \leq n.$$

*Démonstration.* On a

$$\Sigma^H \Sigma = (U^H A V)^H U^H A V = V^H A^H U^H U A V = V^H A^H A V = V^{-1} A^H A V$$

où nous avons utilisé le fait que  $U$  et  $V$  sont unitaires pour conclure  $U^H U = I_n$  et  $V^H = V^{-1}$ . La matrice diagonale  $\Sigma^H \Sigma$  contient les valeurs propres de  $A^H A$  et les colonnes de  $V$  des vecteurs propres correspondants. Pour s'en convaincre, il suffit de procéder comme dans la preuve de la Proposition 1.35. Comme  $\Sigma^H \Sigma = \text{diag}(\sigma_i^2(A))_{1 \leq i \leq n}$  et  $\sigma_i(A) \geq 0$  pour tout  $1 \leq i \leq n$ , on a donc

$$\lambda_i(A^H A) = \sigma_i(A)^2 \iff \sigma_i(A) = \sqrt{\lambda_i(A^H A)}. \quad \square$$

**Corollaire 1.42** (Valeurs singulières et rayon spectral d'une matrice hermitienne). Si  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  est une matrice hermitienne, on a

$$\sigma_i(A) = \sqrt{\lambda_i(A)^2} = |\lambda_i(A)|, \quad \rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} \sigma_i(A) = \|A\|_2.$$

*Démonstration.* Comme  $A$  est hermitienne on a  $A^H A = A^2$ . Or, soit  $\lambda$  une valeur propre de  $A$  et  $x \in \mathbb{C}^n$  un vecteur propre associé. Alors

$$Ax = \lambda x \implies AAx = \lambda Ax = \lambda^2 x,$$

à savoir,  $\lambda_i(A^H A) = \lambda_i(A^2) = \lambda_i(A)^2 = \sigma_i(A)^2$  pour tout  $1 \leq i \leq n$ . Par la Définition 1.28 de rayon spectrale, on a de plus

$$\max_{1 \leq i \leq n} \sigma_i(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i(A)| = \rho(A).$$

La conclusion s'ensuit de la Proposition 1.48 plus bas. □

## 1.5 Normes matricielles

**Définition 1.43** (Norme matricielle). Soit  $K$  un corps commutatif. Une norme matricielle sur  $K^{n,n}$  est une application  $\|\cdot\|$  de  $K^{n,n}$  dans  $\mathbb{R}$  telle que, pour tout  $A \in K^{n,n}$ ,

- (i)  $\|A\| > 0$  si  $A \neq 0$  et  $\|A\| = 0$  si et seulement si  $A = 0 \in K^{n,n}$  ;
- (ii)  $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$  pour tout  $\alpha \in K$  ;
- (iii)  $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$  pour tout  $B \in K^{n,n}$ .

La dernière propriété est connue sous le nom d'inégalité triangulaire.

**Remarque 1.44** (Norme sous-multiplicative). Afin d'identifier des normes matricielles d'intérêt pratique, on ajoute souvent la propriété suivante : pour toutes matrices  $A \in K^{n,n}$  et  $B \in K^{n,n}$ ,

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

Une norme matricielle qui satisfait cette propriété s'appelle sous-multiplicative. On verra dans la Proposition 1.49 que les normes subordonnées définies plus bas sont sous-multiplicatives.

Dans le reste de cette section nous allons supposer  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  sans nécessairement le préciser à chaque fois.

**Définition 1.45** (Norme matricielle subordonnée à une norme vectorielle). Soit  $\|\cdot\|$  une norme vectorielle sur  $\mathbb{R}^n$ . On définit la norme matricielle subordonnée à la norme vectorielle  $\|\cdot\|$  par

$$\forall A \in \mathbb{R}^{n,n}, \quad \|A\| := \sup_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

**Remarque 1.46** (Définitions alternatives d'une norme subordonnée). Soit  $\|\cdot\|$  une norme vectorielle sur  $\mathbb{R}^n$ . La norme matricielle subordonnée à  $\|\cdot\|$  vérifie pour tout  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ ,

$$\|A\| = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\| \leq 1} \|Ax\|.$$

Des normes matricielles particulièrement importantes sont les normes  $p$  subordonnées aux normes vectorielles définies par

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \|x\|_p := \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad (1.5)$$

avec  $p \in \mathbb{N}_*$  et

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|. \quad (1.6)$$

Cette définition s'étend à  $p$  réel  $\geq 1$ , mais les valeurs entières de  $p$  sont les plus souvent utilisées en pratique.

**Proposition 1.47** (Norme d'un produit matrice-vecteur). *Soit  $\|\cdot\|$  une norme matricielle subordonnée à la norme vectorielle  $\|\cdot\|$ . Alors pour toute matrice  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  et tout vecteur  $x \in \mathbb{R}^n$ ,*

$$\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|.$$

*Démonstration.* Si  $x = 0 \in \mathbb{R}^n$ , le résultat est trivial. Si  $x \neq 0 \in \mathbb{R}^n$ , on a par définition

$$\|A\| := \sup_{y \in \mathbb{R}^n, y \neq 0} \frac{\|Ay\|}{\|y\|} \geq \frac{\|Ax\|}{\|x\|},$$

où la deuxième inégalité vient de la définition de supremum. □

**Proposition 1.48** (Normes 1, 2 et  $\infty$ ). *On a*

$$\|A\|_2 = \|A^T\|_2 = \max_{1 \leq i \leq n} \sigma_i(A), \quad (1.7)$$

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|, \quad (1.8)$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|. \quad (1.9)$$

*Démonstration.* Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ .

1) *Preuve de (1.7).* On commence par remarquer que la matrice  $A^T A$  est symétrique. De par le Corollaire 1.39, il existe une matrice orthogonale  $U \in \mathbb{R}^{n,n}$  telle que  $U A^T A U^T = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1(A^T A), \dots, \lambda_n(A^T A))$  où on a noté  $\lambda_i(A^T A) \geq 0$ ,  $1 \leq i \leq n$ , les valeurs propres de  $A^T A$  (le fait que ces valeurs propres soient non négatives est une conséquence de la Proposition 1.41). Nous avons alors que

$$\begin{aligned} \|A\|_2 &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_2=1} \|Ax\|_2 && \text{Définition 1.45} \\ &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_2=1} \sqrt{x^T A^T A x} && \text{Éq. (1.5)} \\ &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_2=1} \sqrt{x^T U^T \Lambda U x} && A^T A = U^T \Lambda U \\ &= \sup_{y \in \mathbb{R}^n, \|U^T y\|_2=1} \sqrt{y^T \Lambda y} && y := U x \\ &= \sup_{y \in \mathbb{R}^n, \|y\|_2=1} \sqrt{y^T \Lambda y} && \text{Remarque 1.16} \\ &= \max_{1 \leq i \leq n} \sqrt{\lambda_i(A^T A)} = \max_{1 \leq i \leq n} \sigma_i(A), && \text{Proposition 1.41} \end{aligned}$$

ce qui prouve le premier point.

2) *Preuve de (1.8).* Pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$  on a que

$$\|Ax\|_1 = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j| = \sum_{j=1}^n |x_j| \left( \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) \leq \left( \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) \|x\|_1.$$

Par conséquent,

$$\|A\|_1 = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_1=1} \|Ax\|_1 \leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|. \quad (1.10)$$

Soit maintenant  $\hat{j}$  l'indice qui réalise le maximum à droite de l'expression précédente, de telle sorte à avoir :

$$\sum_{i=1}^n |a_{i\hat{j}}| = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

En choisissant  $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$  tel que  $\hat{x}_{\hat{j}} = 1$  et  $\hat{x}_j = 0$  pour tout  $j \neq \hat{j}$ , on a  $\|\hat{x}\|_1 = 1$  et

$$\|A\hat{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j \right| = \sum_{i=1}^n |a_{i\hat{j}}| = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|. \quad (1.11)$$

En combinant (1.10) et (1.11) nous avons que

$$\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = \|A\hat{x}\|_1 \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_1=1} \|Ax\|_1 = \|A\|_1 \leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|,$$

ce qui prouve (1.8).

3) *Preuve de (1.9).* Pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$  on a que

$$\begin{aligned} \|Ax\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq n} \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \\ &\leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j| \\ &\leq \max_{1 \leq i \leq n} \left( \max_{1 \leq j \leq n} |x_j| \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right) \leq \left( \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right) \|x\|_\infty. \end{aligned}$$

(Justifier soigneusement les passages à la deuxième et à la troisième ligne.) Par conséquent,

$$\|A\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_\infty=1} \|Ax\|_\infty \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|. \quad (1.12)$$

Notons  $\hat{i}$  l'indice qui réalise le maximum dans l'expression précédente, et considérons le vecteur  $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$  tel que, pour tout  $1 \leq j \leq n$ ,  $\hat{x}_j = 1$  si  $a_{\hat{i}j} \geq 0$ ,  $\hat{x}_j = -1$  sinon. On a clairement  $\|\hat{x}\|_\infty = 1$  et

$$\|A\hat{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j \right| = \sum_{j=1}^n |a_{\hat{i}j}|. \quad (1.13)$$



L'équation (1.13) demande une justification détaillée. Définissons les ensembles suivants :

$$\mathcal{A} := \left\{ \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j \right| : 1 \leq i \leq n \right\}, \quad \mathcal{B} := \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| : 1 \leq i \leq n \right\}.$$

On démontre aisément que pour tout  $\alpha \in \mathcal{A}$ , il existe  $\beta \in \mathcal{B}$  tel que  $\alpha \leq \beta$ . En effet, si  $i$  est tel que  $\alpha = \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j \right|$ , il suffit de prendre  $\beta = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$  et d'utiliser l'inégalité triangulaire avec le fait que  $|\hat{x}_j| = 1$  pour tout  $1 \leq j \leq n$ . De plus, par définition de  $\hat{i}$ , on a que

$$\max_{\beta \in \mathcal{B}} \beta = \sum_{j=1}^n |a_{ij}| = \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j = \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j \right| \in \mathcal{A},$$

où nous avons utilisé le fait que tous les termes de la somme sont positifs dans la troisième égalité. En combinant les résultats précédents on déduit (1.13). Enfin, la relation (1.9) s'ensuit en combinant (1.12) et (1.13) comme dans le point 2) de cette preuve.  $\square$

**Proposition 1.49** (Propriétés des normes subordonnées). *Soit  $\|\cdot\|$  une norme matricielle subordonnée sur  $\mathbb{R}^{n,n}$ . Alors,*

- (i) *pour toute matrice  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  il existe  $x_A \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  tel que  $\|A\| = \|Ax_A\|/\|x_A\|$  ;*
- (ii) *en notant  $I_n$  la matrice identité de taille  $n$ , on a  $\|I_n\| = 1$  ;*
- (iii) *pour toutes matrices  $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$ ,  $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ .*

*Démonstration.* (i) La fonction  $\|Ax\|$  définie sur  $\mathbb{R}^n$  et à valeurs réelles est par définition continue car  $\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$ . Par conséquent, elle atteint son maximum sur le compact  $\|x\| = 1$ .

(ii) On a par définition  $\|I_n\| = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|=1} \|I_n x\| = 1$ .

(iii) On peut écrire :

$$\|AB\| = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{\|ABx\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{\|A\| \|Bx\|}{\|x\|} = \|A\| \sup_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{\|Bx\|}{\|x\|} = \|A\| \|B\|,$$

où nous avons utilisé la Proposition 1.47 dans l'inégalité, sorti  $\|A\|$  du sup dans le troisième passage, et utilisé à nouveau la Définition 1.45 de norme matricielle subordonnée pour conclure.  $\square$

On admettra le résultat suivant qui relie le rayon spectral avec les normes matricielles subordonnées.

**Lemme 1.50** (Rayon spectral et normes subordonnées). *On a les résultats suivants :*

- (i) *Soit  $\|\cdot\|$  une norme matricielle subordonnée. Alors, pour toute matrice  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ ,  $\rho(A) \leq \|A\|$  ;*
- (ii) *Pour toute matrice  $A$  et tout réel  $\epsilon > 0$ , il existe une norme subordonnée  $\|\cdot\|$  telle que*

$$\|A\| \leq \rho(A) + \epsilon.$$

## 1.6 Exercices

**Exercice 1.51** (Matrice SDP). Soit  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice SDP. Prouver que  $a_{kk} > 0$  pour tout  $1 \leq k \leq n$ .

Comme  $A$  est SDP, on a pour tout  $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0 \in \mathbb{R}^n\}$

$$x^T A x = (Ax, x)_{\mathbb{R}^n} > 0.$$

En prenant  $x = e^k$  avec  $e^k$   $k$ -ème vecteur de la base canonique de  $\mathbb{R}^n$  tel que  $e_l^k = \delta_{kl}$  pour tout  $1 \leq l \leq n$ , nous avons

$$0 < (Ae^k, e^k)_{\mathbb{R}^n} = \sum_{i=1}^n e_i^k \sum_{j=1}^n a_{ij} e_j^k = \sum_{i=1}^n e_i^k a_{ik} = a_{kk},$$

qui est le résultat cherché.

**Exercice 1.52** (Matrice antisymétrique). Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice antisymétrique, à savoir  $A^T = -A$ . On pose

$$B_{\pm} := I_n \pm A.$$

On supposera  $B_-$  inversible. (i) Vérifier que  $B_+$  est inversible et identifier son inverse. (ii) Vérifier que  $B_-$  est normale. (iii) Montrer que la matrice  $C := B_+ B_-^{-1}$  est orthogonale, à savoir,  $B_-^{-1} = B_+^T$ .

(i) Comme  $A$  est antisymétrique on a

$$B_-^T = (I_n - A)^T = I_n - A^T = I_n + A = B_+.$$

Par conséquent

$$I_n = B_-^{-1} B_- \implies I_n = I_n^T = (B_-^{-1} B_-)^T = B_-^T B_-^{-T} = B_+ B_-^{-T},$$

Partant de  $I_n = B_- B_-^{-1}$  et procédant de façon similaire, on obtient que  $I_n = B_-^{-T} B_+$ . Par définition de matrice inversible (voir la Définition 1.18), ceci montre que  $B_+$  est inversible avec

$$B_+^{-1} = B_-^{-T}. \quad (1.14)$$

(ii) Un calcul direct montre que

$$B_-^T B_- = B_+ B_- = I_n - A^2, \quad B_- B_-^T = B_- B_+ = I_n - A^2,$$

ce qui prouve que  $B_-$  est normale car nous avons  $B_-^T B_- = B_- B_-^T$ . Comme  $B_-$  est inversible, nous avons, de plus,

$$B_-^{-1} B_-^{-T} = (B_-^T B_-)^{-1} = (B_- B_-^T)^{-1} = B_-^{-T} B_-^{-1}. \quad (1.15)$$

(iii) On a

$$C C^T = (B_+ B_-^{-1})(B_+ B_-^{-1})^T = B_+ B_-^{-1} B_-^{-T} B_+^T = B_+ B_-^{-T} B_-^{-1} B_+^T, \quad (1.16)$$

où nous avons utilisé la Proposition 1.11 dans la deuxième égalité et (1.15) pour conclure. Multipliant (1.14) à gauche par  $B_+$  nous avons

$$B_+ B_-^{-T} = I_n. \quad (1.17)$$

Prenant l'inverse transposée de (1.14) on trouve  $B_+^T = B_-$ . Multipliant cette égalité à gauche par  $B_-^{-1}$ , on trouve

$$B_-^{-1} B_+^T = I_n. \quad (1.18)$$

Tenant compte de (1.17) et (1.18) dans (1.16), on conclut

$$C C^T = (B_+ B_-^{-T})(B_-^{-1} B_+^T) = I_n I_n = I_n.$$

De façon similaire on montre que  $C^T C = I_n$  (les détails sont laissé en exercice).

**Exercice 1.53** (Matrice hermitienne et antihermitienne). Une matrice  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  est dite antihermitienne si  $A^H = -A$ . Montrer que

- (i) les éléments diagonaux d'une matrice hermitienne sont des réels, tandis que ceux d'une matrice antihermitienne sont des imaginaires purs;
- (ii) montrer que, si une matrice triangulaire est hermitienne ou antihermitienne, elle est diagonale.

(i) Si  $A$  est hermitienne on a  $a_{ii} = \overline{a_{ii}}$  pour tout  $1 \leq i \leq n$ , à savoir,  $\Im(a_{ii}) = 0 \implies a_{ii} \in \mathbb{R}$ . Si  $A$  est antihermitienne,  $a_{ii} = -\overline{a_{ii}} \implies \Re(a_{ii}) = 0$  pour tout  $1 \leq i \leq n$ .

(ii) Supposons  $A$  triangulaire supérieure (resp. inférieure). Si  $A$  est hermitienne ou antihermitienne on a  $a_{ij} = \pm 0 \implies a_{ij} = 0$  pour tout  $j > i$  (resp.  $i > j$ ), à savoir,  $A$  est diagonale.

**Exercice 1.54** (Matrices de Hilbert). La matrice de Hilbert  $H(n) = (h_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,n}$  d'ordre  $n \geq 1$  est la matrice carrée symétrique à valeurs réelles telle que

$$h_{ij} = \frac{1}{i+j-1}.$$

Montrer que  $H(n)$  est définie positive.

Pour tout  $1 \leq i, j \leq n$ , on remarque que

$$h_{ij} = \frac{1}{i+j-1} = \int_0^1 t^{j-1} t^{i-1} dt. \quad (1.19)$$

Soit maintenant  $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n$  non nul. On a

$$\begin{aligned} x^T H(n) x &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_j h_{ij} x_i \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_0^1 (x_j t^{j-1})(x_i t^{i-1}) dt \\ &= \int_0^1 \left( \sum_{j=1}^n x_j t^{j-1} \right) \left( \sum_{i=1}^n x_i t^{i-1} \right) dt \\ &= \int_0^1 w(t)^2 dt > 0, \end{aligned} \quad (1.19) \quad w(t) := \sum_{i=1}^n x_i t^{i-1}$$

où on a conclu grâce au fait que, par hypothèse,  $w$  n'est pas la fonction identiquement nulle.

**Exercice 1.55.** Soient  $A, B \in \mathbb{R}^{n,n}$  deux matrices inversibles telles que  $A + B$  est inversible. Montrer que  $A^{-1} + B^{-1}$  est inversible et qu'on a

$$(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = B(A + B)^{-1}A = A(A + B)^{-1}B.$$

On observe que

$$A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(I_n + AB^{-1}) = A^{-1}(B + A)B^{-1}.$$

Or,  $A, B$  et  $A + B$  étant inversibles, nous avons que

$$B(A + B)^{-1}A = [A^{-1}(B + A)B^{-1}]^{-1} = (A^{-1} + B^{-1})^{-1},$$

ce qui prouve la première égalité. Pour prouver la deuxième on procède de manière analogue en factorisant  $A^{-1}$  à droite et  $B^{-1}$  à gauche.

**Exercice 1.56** (Valeurs propres d'un polynôme à variable matricielle). Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$ . Montrer que, si  $P(A) := \sum_{k=0}^N c_k A^k$  et  $\text{Sp}(A)$  est le spectre de  $A$ , on a  $\text{Sp}(P(A)) = P(\text{Sp}(A))$ .

Par la suite, l'opérateur diag est utilisé comme la commande Matlab correspondante. De par le Théorème 1.38 (décomposition de Schur), il existe  $U \in \mathbb{C}^{n,n}$  unitaire telle que  $A = UTU^H$  avec  $T$  triangulaire supérieure contenant les valeurs propres de  $A$  sur sa diagonale. On peut exprimer ce dernier fait en écrivant (avec un petit abus de notation)

$$\text{diag}(T) = \text{Sp}(A). \quad (1.20)$$

(i) On montre d'abord que

$$\text{Sp}(P(T)) = P(\text{Sp}(A)), \quad (1.21)$$

à savoir, les valeurs propres de la matrice  $P(T)$  sont de la forme  $P(\lambda)$  avec  $\lambda$  valeur propre de  $A$ . En combinant la définition de  $T$  avec la Proposition 1.27 concernant les valeurs propres d'une matrice triangulaire, nous avons

$$\text{Sp}(T) = \text{Sp}(A).$$

D'autre part, nous avons aussi que (justifier la troisième égalité)

$$P(A) = \sum_{k=0}^N c_k A^k = \sum_{k=0}^N c_k (UTU^H)^k = \sum_{k=0}^N c_k (UT^k U^H) = \sum_{k=0}^N U(c_k T^k)U^H = UP(T)U^H.$$

Or,  $P(T)$  est triangulaire supérieure car somme de matrices triangulaires supérieures (prouver que  $T^k$  est triangulaire supérieure pour tout  $0 \leq k \leq N$ ), et

$$\text{diag}(\text{diag}(P(T))) = \text{diag}(P(\text{diag}(T))) = \text{diag}(P(\text{Sp}(A))),$$

où nous avons utilisé (1.20) pour conclure. De par la Proposition 1.27, nous avons donc que le spectre de  $P(T)$  coïncide avec l'ensemble  $\{P(\lambda) : \lambda \in \text{Sp}(A)\}$ , ce qui prouve (1.22).

(ii) Pour conclure, il suffit de montrer que

$$\text{Sp}(P(T)) = \text{Sp}(P(A)), \quad (1.22)$$

c.-à-d., que les valeurs propres de  $P(T)$  coïncident avec celles de  $P(A)$ . En effet, en combinant (1.21) avec (1.22) on a immédiatement  $\text{Sp}(P(A)) = P(\text{Sp}(A))$ , qui est la conclusion cherchée. Soit  $\lambda \in \text{Sp}(P(A))$  une valeur propre de  $P(A)$  et  $x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0 \in \mathbb{C}^n\}$  un vecteur propre associé. Nous avons que

$$P(A)x = \lambda x \implies UP(T)U^H x = \lambda x \implies P(T)U^H x = \lambda U^H x,$$

ce qui montre que  $\lambda \in \text{Sp}(P(T))$  et  $U^H x$  est un vecteur propre associé. Par conséquent,  $\text{Sp}(P(A)) \subset \text{Sp}(P(T))$ . On prouve de manière similaire que  $\text{Sp}(P(T)) \subset \text{Sp}(P(A))$ , ce qui conclut l'exercice.

**Exercice 1.57** (Valeurs singulières de l'inverse d'une matrice). Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  inversible. Exprimer les valeurs singulières de  $A^{-1}$  en fonction de celles de  $A$ .

De par le Théorème 1.40 il existent deux matrices unitaires  $U, V \in \mathbb{C}^{n,n}$  telles que  $U^H AV = \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$  avec  $(\sigma_i)_{1 \leq i \leq n}$  valeurs singulières de  $A$ . On a donc,

$$(U^H AV)^{-1} = \Sigma^{-1} \iff V^{-1}A^{-1}(U^H)^{-1} = \Sigma^{-1} \iff V^H A^{-1}U = \Sigma^{-1},$$

qui est la DVS de  $A^{-1}$ . Par conséquent  $\Sigma^{-1} = \text{diag}(\frac{1}{\sigma_1}, \dots, \frac{1}{\sigma_n})$  contient les valeurs singulières de  $A^{-1}$ .

**Exercice 1.58** (Inégalité de Kantorovitch). Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  SDP, et soit  $\lambda_{\min}$  et  $\lambda_{\max}$  respectivement la plus petite et la plus grande valeur propre de  $A$ . Alors, pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$(Ax, x)(A^{-1}x, x) \leq \frac{1}{4} \left( \sqrt{\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}} + \sqrt{\frac{\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}}} \right)^2 \|x\|_2^4.$$

De par le Corollaire 1.39, il existe une matrice orthogonale  $U$  telle que

$$A = UDU^T = UDU^{-1}, \quad D = \text{diag}(\lambda)_{\lambda \in \text{Sp}(A)}.$$

Soit  $t := \sqrt{\lambda_{\min}\lambda_{\max}}$ . On a

$$\frac{1}{t}A + tA^{-1} = U \left( \frac{1}{t}D + tD^{-1} \right) U^{-1} := U\Delta U^{-1}, \quad (1.23)$$

avec  $\Delta = \text{diag}(\lambda/t + t/\lambda)_{\lambda \in \text{Sp}(A)}$ . La fonction  $f(\xi) := \xi/t + t/\xi$  est convexe sur  $\mathbb{R}_*^+$  et elle atteint son minimum en  $\xi = t$ , comme on le voit en résolvant

$$0 = f'(\xi) = \frac{1}{t} - \frac{t}{\xi^2} \iff (\xi^2 - t^2 = 0 \text{ et } t > 0) \iff \xi = t.$$

De plus, on a

$$\max_{\xi \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]} f = f(\lambda_{\min}) = f(\lambda_{\max}) = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}} + \sqrt{\frac{\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}}}.$$

Par conséquent, pour tout  $\xi \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$ ,

$$f(\xi) \leq \sqrt{\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}} + \sqrt{\frac{\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}}}. \quad (1.24)$$

On a donc, pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\sqrt{(Ax, x)(A^{-1}x, x)} \leq \frac{1}{2} \left( \frac{1}{t}(Ax, x) + t(A^{-1}x, x) \right) \quad \sqrt{ab} \leq \frac{a}{2\epsilon} + \frac{b\epsilon}{2} \quad \forall a, b \geq 0, \forall \epsilon > 0$$

$$= \frac{1}{2} \left( \left( \frac{1}{t}A + tA^{-1} \right) x, x \right) \\ = \frac{1}{2} (U \Delta U^{-1} x, x) \quad \text{Éq. (1.23)}$$

$$= \frac{1}{2} (\Delta y, y) \quad y := U^T x, U^{-1} = U^T$$

$$\leq \frac{1}{2} \left( \sqrt{\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}} + \sqrt{\frac{\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}}} \right) \|y\|_2^2 \quad \text{Éq. (1.24)}$$

$$\leq \frac{1}{2} \left( \sqrt{\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}} + \sqrt{\frac{\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}}} \right) \|x\|_2^2, \quad \text{Remarque (1.16)}$$

ce qui permet de conclure.

**Exercice 1.59.** Soit  $A$  une matrice HDP et  $\alpha \in \mathbb{R}_*^+$ . Montrer que la matrice  $I_n + \alpha A$  est inversible, que le rayon spectral de la matrice  $B := (I_n - \alpha A)(I_n + \alpha A)^{-1}$  est  $< 1$  et que la matrice  $B$  est hermitienne.

La matrice  $A$  est hermitienne donc diagonalisable (voir Corollaire 1.39), à savoir, il existe une matrice unitaire  $Q \in \mathbb{C}^{n,n}$  telle que  $A = Q^{-1} \Lambda Q$ , avec  $\Lambda \in \mathbb{R}^{n,n}$  matrice diagonale contenant les valeurs propres de  $A$  (le fait que les valeurs propres de  $A$  sont des réels strictement positifs est une conséquence de la Proposition 1.26). Nous avons donc

$$I_n \pm \alpha A = Q^{-1} Q \pm \alpha Q^{-1} \Lambda Q = Q^{-1} (I_n \pm \alpha \Lambda) Q,$$

ce qui permet de conclure que la matrice  $I_n \pm \alpha A$  est diagonalisable et ses valeurs propres sont de la forme  $1 \pm \alpha \lambda$ ,  $\lambda \in \text{Sp}(A)$ . De par le Théorème 1.33, la matrice  $I_n + \alpha A$  est inversible si et seulement si toutes ses valeurs propres sont non nulles, à savoir  $\alpha \neq -1/\lambda$  pour tout  $\lambda \in \text{Sp}(A)$ , ce qui est toujours vérifié car  $\alpha > 0$  par hypothèse. De plus,

$$(I_n + \alpha A)^{-1} = [Q^{-1} (I_n + \alpha \Lambda) Q]^{-1} = Q^{-1} (I_n + \alpha \Lambda)^{-1} Q,$$

et  $(I_n + \alpha \Lambda)^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{1+\alpha\lambda}\right)_{\lambda \in \text{Sp}(A)}$ . De par les résultats précédents, on a

$$B = (I_n - \alpha A)(I_n + \alpha A)^{-1} = Q^{-1} (I_n - \alpha \Lambda) Q Q^{-1} (I_n + \alpha \Lambda)^{-1} Q = Q^{-1} \tilde{\Lambda} Q, \quad (1.25)$$

avec  $\tilde{\Lambda} = \text{diag}(\tilde{\lambda})_{\tilde{\lambda} \in \text{Sp}(B)} = \text{diag}\left(\frac{1-\alpha\lambda}{1+\alpha\lambda}\right)_{\lambda \in \text{Sp}(A)}$  matrice diagonale contenant les valeurs propres de  $B$ . Comme les valeurs propres de  $A$  sont  $> 0$ , on vérifie aisément que  $|\tilde{\lambda}| < 1$  pour tout  $\tilde{\lambda} \in \text{Sp}(B)$  si  $\alpha > 0$  et, par conséquent,  $\rho(B) := \max_{\tilde{\lambda} \in \text{Sp}(B)} |\tilde{\lambda}| < 1$ . Pour prouver que  $B$  est hermitienne, on utilise la décomposition (1.25) pour écrire

$$B^H = (Q^H \tilde{\Lambda} Q)^H = Q^H \tilde{\Lambda}^H Q = Q^H \tilde{\Lambda} Q = B,$$

où nous avons utilisé le fait que  $\tilde{\Lambda}$  est une matrice diagonale à valeurs réelles pour conclure  $\tilde{\Lambda}^H = \tilde{\Lambda}$ .

**Exercice 1.60** (Pseudo-inverse de Moore–Penrose). Soient  $m$  et  $n$  deux entiers avec  $m \geq n$ , et soit  $A \in \mathbb{R}^{m,n}$  une matrice de rang  $n$ . On admettra par la suite que  $A^T A \in \mathbb{R}^{n,n}$  est définie positive et donc inversible. On définit la pseudo-inverse de Moore–Penrose par

$$A^\dagger := (A^T A)^{-1} A^T.$$

Prouver les propriétés suivantes :

$$A^\dagger A = I_n, \quad A^\dagger A A^\dagger = A^\dagger, \quad \text{si } m = n, A^\dagger = A^{-1};$$

Soit  $b \in \mathbb{R}^m$ . On considère le problème dit aux moindres carrés

$$\min_{y \in \mathbb{R}^n} \{J(y) := \|Ay - b\|_2^2\}.$$

Ce problème admet une unique solution  $x$  caractérisée par la propriété  $\nabla J(y) = 0$ . Montrer que  $x = A^\dagger b$ .

On a  $A^\dagger A = (A^T A)^{-1} (A^T A) = I_n$ , d'où, en multipliant à droite par  $A^\dagger$ ,  $A^\dagger A A^\dagger = I_n A^\dagger = A^\dagger$ . Pour prouver le deuxième point on observe que, pour tout  $y \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\begin{aligned} J(y) &= (Ay - b)^T (Ay - b) \\ &= (Ay)^T Ay - (Ay)^T b - b^T Ay + b^T b \\ &= y^T (A^T A) y - y^T A^T b - b^T A y + b^T b. \\ &= y_j (A^T A)_{ij} y_i - y_i (A^T b)_i - (b^T A)_i y_i + b_i b_i \end{aligned}$$

où par brévit  nous avons utilis  la notation de Einstein qui sous-entend les sommes sur les indices rep t s. Par cons quent, pour tout  $1 \leq k \leq n$ ,

$$\frac{\partial J(y)}{\partial y_k} = (A^T A)_{ik} y_i + y_j (A^T A)_{kj} - (A^T b)_k - (b^T A)_k,$$

  savoir,

$$\nabla J(y) = 2(A^T A)y - 2A^T b.$$

La condition d'optimalit  donne

$$\nabla J(x) = 2(A^T A)x - 2A^T b = 0 \iff x = (A^T A)^{-1} A^T b = A^\dagger b.$$

**Exercice 1.61** (Valeurs singuli res d'une matrice normale). Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  une matrice normale. Montrer que les valeurs singuli res de  $A$  sont les modules de ses valeurs propres.

**Exercice 1.62** (In galit  triangulaire). Soit  $\|\cdot\|$  une norme matricielle subordonn e. Prouver que pour tout  $A, B \in \mathbb{C}^{n,n}$ ,

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|.$$

Montrer que toute norme subordonn e satisfait  galement les deux premi res propri t s caract risant une norme matricielle (voir D finition 1.43).

On a

$$\begin{aligned}\|A + B\| &:= \sup_{x \in \mathbb{C}^n, \|x\|=1} \|(A + B)x\| = \sup_{x \in \mathbb{C}^n, \|x\|=1} \|Ax + Bx\| \\ &\leq \sup_{x \in \mathbb{C}^n, \|x\|=1} (\|Ax\| + \|Bx\|) \\ &\leq \sup_{x \in \mathbb{C}^n, \|x\|=1} \|Ax\| + \sup_{x \in \mathbb{C}^n, \|x\|=1} \|Bx\| := \|A\| + \|B\|,\end{aligned}$$

où nous avons utilisé l'inégalité triangulaire pour la norme vectorielle pour passer à la deuxième ligne. Le second point est laissé au lecteur.

**Exercice 1.63** (Norme d'une matrice unitaire). Soit  $U \in \mathbb{C}^{n,n}$  une matrice unitaire. Prouver que  $\|U\|_2 = 1$  et que pour tout  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  on a  $\|AU\|_2 = \|UA\|_2 = \|A\|_2$ .

Soit  $x \in \mathbb{C}^n$ . Par définition on a  $\|Ux\|_2^2 = (Ux)^H(Ux) = x^H U^H U x = x^H x = \|x\|_2^2$ . Par conséquent,

$$\|U\|_2 = \sup_{x \in \mathbb{C}^n, \|x\|_2=1} \|Ux\|_2 = 1.$$

Un raisonnement similaire montre que  $\|U^H\|_2 = 1$ . D'autre part,

$$\|AU\|_2 = \sup_{x \in \mathbb{C}^n, \|x\|_2=1} \|AUx\|_2 = \sup_{y \in \mathbb{C}^n, \|U^{-1}y\|_2=1} \|Ay\|_2 = \sup_{y \in \mathbb{C}^n, \|y\|_2=1} \|Ay\|_2,$$

où nous avons utilisé le point précédent pour conclure  $\|U^{-1}y\|_2 = \|U^H y\|_2 = \|y\|_2$ .

**Exercice 1.64** (Norme de Frobenius). Soit  $A = (a_{ik}) \in \mathbb{R}^{n,n}$ . La norme de Frobenius est définie par

$$\|A\|_F := \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}.$$

Cette norme n'est pas subordonnée à une norme vectorielle. Prouver que

$$\frac{1}{n} \|A\|_1 \leq \|A\|_F \leq \sqrt{n} \|A\|_1, \quad \frac{1}{n} \|A\|_\infty \leq \|A\|_F \leq \sqrt{n} \|A\|_\infty. \quad (1.26)$$

Calculer  $\|I_n\|_F$ .

(i) **Équivalence entre la norme de Frobenius et la norme 1.** Il est utile de rappeler que

$$\|A\|_F^2 := \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2, \quad \|A\|_1 := \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|, \quad \|A\|_\infty := \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Or,

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \leq \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n 1 \times |a_{ij}| \leq \left( \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n 1^2 \right)^{\frac{1}{2}} \times \left( \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = n \|A\|_F,$$

ou nous avons utilisé l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans le deuxième passage. Pour prouver la borne supérieure, on observe que

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \leq n \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|^2 \leq n \max_{1 \leq j \leq n} \left( \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right)^2 = n \|A\|_1^2,$$

d'où  $\|A\|_F \leq \sqrt{n} \|A\|_1$ .



**(ii) Équivalence entre la norme de Frobenius et la norme  $\infty$ .** On commence par remarquer que, pour toute matrice  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ , on a  $\|A\|_F = \|A^T\|_F$  et  $\|A\|_\infty = \|A^T\|_1$ . En utilisant la réponse donnée au point précédent on a donc

$$\frac{1}{n}\|A^T\|_1 \leq \|A^T\|_F = \|A\|_F \leq \sqrt{n}\|A^T\|_1 \implies \frac{1}{n}\|A\|_\infty \leq \|A\|_F \leq \sqrt{n}\|A\|_\infty.$$

**(iii) Norme de Frobenius de la matrice identité.** On a  $\|I_n\|_F = \sqrt{n}$ .

**Exercice 1.65** (Rayon spectral). Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice SDP. Montrer que  $\rho(A) < 1$  si et seulement s'il existe une matrice  $Q \in \mathbb{R}^{n,n}$  SDP telle que  $B := Q - A^T Q A$  est SDP.

**(i) Preuve de  $\rho(A) < 1 \implies (\exists Q \in \mathbb{R}^{n,n}, B \text{ SDP})$ .** Il suffit de prendre  $Q = I_n$ . En effet, avec ce choix on a pour tout  $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0 \in \mathbb{R}^n\}$ ,

$$\begin{aligned} x^T B x &= x^T (I_n - A^T I_n A) x \\ &= \|x\|_2^2 - \|Ax\|_2^2 \\ &\geq \|x\|_2^2 - \|A\|_2^2 \|x\|_2^2 && \text{Proposition 1.47} \\ &= (1 - \rho(A)^2) \|x\|_2^2 > 0, && \text{Corollaire 1.42} \end{aligned}$$

ce qui montre le caractère défini positif de  $B$ .

**(ii) Preuve de  $(\exists Q \in \mathbb{R}^{n,n}, B \text{ SDP}) \implies \rho(A) < 1$ .** Soit  $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0 \in \mathbb{R}^n\}$  et posons  $y := Ax$ . On a par hypothèse

$$x^T B x > 0 \implies x^T (Q - A^T Q A) x > 0 \implies x^T Q x - x^T A^T Q A x > 0 \implies y^T Q y < x^T Q x. \quad (1.27)$$

Soit  $\bar{\lambda}$  la plus grande valeur propre (en valeur absolue) de  $A$ ,  $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$  un vecteur propre associé avec  $\|\bar{x}\|_2 = 1$ , et  $\bar{y} := A\bar{x} = \bar{\lambda}\bar{x}$ . De par la relation (1.27) on a

$$\bar{x}^T Q \bar{x} > \bar{y}^T Q \bar{y} = \bar{\lambda}^2 \bar{x}^T Q \bar{x},$$

ce qui prouve  $\bar{\lambda} < 1$  et, par conséquent,  $\rho(A) < 1$ .

# Chapitre 2

## Méthodes directes

Dans ce chapitre on étudie quelques exemples de méthodes *directes* pour la résolution du système

$$Ax = b. \quad (2.1)$$

Aux erreurs d'arrondi près, ces méthodes permettent de résoudre le système de manière exacte. Par simplicité, nous allons nous restreindre au cas réel et, sauf indication contraire, on supposera dans la suite que  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ ,  $x \in \mathbb{R}^n$  et  $b \in \mathbb{R}^n$  est non nul.

### 2.1 Solution numérique des systèmes linéaires

On s'intéresse à l'effet des erreurs d'arrondi sur la précision de la solution obtenue par la méthode de Gauss.

#### 2.1.1 Conditionnement d'une matrice

**Définition 2.1** (Conditionnement d'une matrice). Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  inversible et  $\|\cdot\|$  une norme matricielle subordonnée. Le conditionnement de  $A$  est le réel

$$\text{cond}(A) := \|A\| \|A^{-1}\|.$$

Comme  $\|\cdot\|$  est une norme subordonnée, nous avons

$$1 = \|I_n\| = \|AA^{-1}\| \leq \|A\| \|A^{-1}\| = \text{cond}(A),$$

à savoir, le conditionnement d'une matrice est toujours  $\geq 1$ . Pour  $p \in \mathbb{N}_* \cup \{\infty\}$ , on définit  $\text{cond}_p(A) := \|A\|_p \|A^{-1}\|_p$  le conditionnement associé à la norme  $p$ . Un cas particulièrement important est  $p = 2$ , pour lequel on a, d'après la Proposition 1.48,

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\sigma_1(A)}{\sigma_n(A)},$$

où  $\sigma_1(A)$  et  $\sigma_n(A)$  dénotent, respectivement, la plus grande et la plus petite valeur singulière de  $A$  (le fait que  $1/\sigma_n(A)$  est la plus grande valeur singulière de  $A^{-1}$  est justifié dans l'Exercice 1.57). Si, de plus,  $A$  est hermitienne, de par le Corollaire 1.42 on a

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda|}{\min_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda|} = \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda| \times \max_{\mu \in \text{Sp}(A^{-1})} |\mu| = \rho(A)\rho(A^{-1}) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2, \quad (2.2)$$

ce qui justifie l'appellation de *nombre de conditionnement spectral*.

## 2.1.2 Analyse a priori

**Proposition 2.2.** Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  telle que  $\rho(A) < 1$ . Alors, la matrice  $I_n - A$  est inversible et on a, pour toute norme matricielle subordonnée telle que  $\|A\| < 1$ ,

$$\frac{1}{1 + \|A\|} \leq \|(I_n - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}. \quad (2.3)$$

*Démonstration.* La preuve procède en trois étapes.

(i) On commence par prouver que  $I_n - A$  est inversible. Les valeurs propres de  $A$  sont les solutions dans  $\mathbb{C}$  de l'équation caractéristique

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

En ajoutant et soustrayant  $I_n$  à l'argument du déterminant, on voit que  $\lambda$  est solution de cette équation si et seulement si

$$\det((A - I_n) + (1 - \lambda)I_n) = 0,$$

ce qui montre que

$$\text{Sp}(A - I_n) = \{1 - \lambda : \lambda \in \text{Sp}(A)\}.$$

Or, on a que

$$|1 - \lambda| \geq 1 - |\lambda| \geq 1 - \rho(A) > 0,$$

où nous avons utilisé la Définition 1.28 du rayon spectral dans la deuxième inégalité et le fait que  $\rho(A) \leq \|A\| < 1$  (cf. Lemma 1.50) pour conclure.

(ii) On prouve ensuite la première inégalité de (2.3). On a que

$$\begin{aligned} 1 &= \|I_n\| && \text{Proposition 1.49(ii)} \\ &= \|(I_n - A)(I_n - A)^{-1}\| && \text{Définition 1.18} \\ &\leq \|I_n - A\| \|(I_n - A)^{-1}\| && \text{Proposition 1.49(iii)} \\ &\leq (\|I_n\| + \|A\|) \|(I_n - A)^{-1}\| && \text{Inégalité triangulaire} \\ &= (1 + \|A\|) \|(I_n - A)^{-1}\| && \text{Proposition 1.49(ii)} \end{aligned}$$

à savoir,

$$\frac{1}{1 + \|A\|} \leq \|(I_n - A)^{-1}\|.$$

(iii) Pour prouver la deuxième inégalité de (2.3), il suffit d'observer que

$$(I_n - A)^{-1} = (I_n - A)^{-1} I_n = (I_n - A)^{-1} (I_n - A + A) = I_n + (I_n - A)^{-1} A,$$

d'où, en passant à la norme et en utilisant l'inégalité triangulaire et à nouveau le point (ii) de la Proposition 1.49,

$$\begin{aligned} \|(I_n - A)^{-1}\| &\leq \|I_n\| + \|(I_n - A)^{-1} A\| \leq 1 + \|(I_n - A)^{-1}\| \|A\| \\ &\iff \|(I_n - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}. \quad \square \end{aligned}$$

**Théorème 2.3** (Estimation d'erreur). Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice inversible et  $\delta A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une perturbation telle que pour une norme matricielle subordonnée  $\|\cdot\|$ ,

$$\|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1. \quad (2.4)$$

On note  $x \in \mathbb{R}^n$  la solution du système linéaire  $Ax = b$  avec  $b \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  et, pour une perturbation du seconde membre  $\delta b \in \mathbb{R}^n$ , soit  $\delta x \in \mathbb{R}^n$  tel que

$$(A + \delta A)(x + \delta x) = b + \delta b.$$

Alors,

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left( \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} \right). \quad (2.5)$$

**Remarque 2.4** (Hypothèse (2.4)). L'hypothèse (2.4) a une interprétation naturelle dans la mesure où elle implique  $\|A^{-1}\delta A\| < 1$ , à savoir, les erreurs d'arrondi sur la matrice  $A$  sont supposées petites par rapport aux valeurs des entrées de  $A$ .

*Démonstration.* Comme  $b \neq 0$  et  $A$  est inversible,  $x \neq 0 \implies \|x\| \neq 0$ . De plus, la matrice  $I_n + A^{-1}\delta A$  est inversible car, par hypothèse,  $\rho(A^{-1}\delta A) \leq \|A^{-1}\delta A\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1$  (la première inégalité est une conséquence du Lemme 1.50, tandis que l'inversibilité suit de la Proposition 2.2).

On peut donc appliquer le résultat de la Proposition 2.2 à la matrice  $-A^{-1}\delta A$ , obtenant ainsi

$(A + \delta A)(x + \delta x) = b + \delta b$ $\implies Ax + \delta Ax + A(I_n + A^{-1}\delta A)\delta x = b + \delta b$ $\implies \frac{\delta x}{\ x\ } = (I + A^{-1}\delta A)^{-1}A^{-1} \left( \frac{\delta b}{\ x\ } - \frac{\delta Ax}{\ x\ } \right)$ $\implies \frac{\ \delta x\ }{\ x\ } \leq \ (I + A^{-1}\delta A)^{-1}\  \ A^{-1}\  \left( \frac{\ \delta b\ }{\ x\ } + \ \delta A\  \right)$ $\implies \frac{\ \delta x\ }{\ x\ } \leq \ (I + A^{-1}\delta A)^{-1}\  \text{cond}(A) \left( \frac{\ \delta b\ }{\ b\ } + \frac{\ \delta A\ }{\ A\ } \right)$ $\implies \frac{\ \delta x\ }{\ x\ } \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \ A^{-1}\delta A\ } \left( \frac{\ \delta b\ }{\ b\ } + \frac{\ \delta A\ }{\ A\ } \right)$ $\implies \frac{\ \delta x\ }{\ x\ } \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \text{cond}(A) \frac{\ \delta A\ }{\ A\ }} \left( \frac{\ \delta b\ }{\ b\ } + \frac{\ \delta A\ }{\ A\ } \right),$	<p>définition de <math>\delta x</math></p> $Ax = b, \quad A + \delta A = A(I_n + A^{-1}\delta A)$ <p>mult. gauche <math>\frac{(I_n + A^{-1}\delta A)^{-1}A^{-1}}{\ x\ }</math></p> $\ \delta Ax\  \leq \ \delta A\  \ x\ $ $\ A\  \ x\  \geq \ Ax\  = \ b\ $ <p>Proposition 2.2</p> $(2.4)$
--	---

qui est l'estimation cherchée. □

**Remarque 2.5.** Si les perturbations  $\delta b$  et  $\delta A$  sont telles que  $\|\delta b\| = \gamma\|b\|$  et  $\|\delta A\| = \gamma\|A\|$  avec  $\gamma \in \mathbb{R}_*^+$  et  $\gamma \text{cond}(A) < 1$ , l'estimation (2.5) se réduit à

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{2\gamma \text{cond}(A)}{1 - \gamma \text{cond}(A)}.$$

En pratique cette hypothèse est raisonnable, et le paramètre  $\gamma$  dépend de l'epsilon machine, à savoir, le plus petit nombre positif  $\epsilon$  tel que  $1 + \epsilon > 1$  en arithmétique flottante.

## 2.2 Opérations élémentaires

Pour fixer les idées, soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice carré d'ordre  $n$ . La généralisation des résultats de cette section au cas de matrices rectangulaires est laissée au lecteur. Les méthodes directes que nous allons examiner reposent sur deux opérations élémentaires, à savoir :

- (i) *L'échange de deux lignes de la matrice  $A$ , que l'on notera  $A_i \leftrightarrow A_j$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ . Lorsqu'on souhaite nommer différemment la matrice obtenue en échangeant les lignes  $i$  et  $j$  de  $A$  on notera*

$$B \leftarrow (A_i \leftrightarrow A_j);$$

- (ii) *La combinaison linéaire d'une ligne  $A_i$  avec une ligne  $A_j$ ,  $1 \leq i \neq j \leq n$ , que l'on notera  $A_i \leftarrow \lambda A_i + \mu A_j$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  avec  $\lambda \neq 0$ . Lorsqu'on souhaite nommer différemment la matrice obtenue en combinant linéairement les lignes  $i$  et  $j$  de  $A$  on notera*

$$B_i \leftarrow \lambda A_i + \mu A_j,$$

en sous-entendant  $B_l = A_l$  pour tout  $l \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i\}$ .

**Remarque 2.6** (Interprétation alternative de l'échange de deux lignes). *Si on relâche l'hypothèse  $\lambda \neq 0$ , l'échange de deux lignes de la matrice  $A$  peut être interprété comme le résultat des deux combinaisons linéaires*

$$B_i \leftarrow 0A_i + 1A_j, \quad B_j \leftarrow 1A_i + 0A_j.$$

*Cependant, sans l'hypothèse  $\lambda \neq 0$  on ne pourra plus garantir des propriétés d'équivalence entre les deux matrices.*

Nous allons par la suite montrer qu'on peut interpréter ces deux opérations élémentaires comme des multiplications à gauche par des matrices opportunes. On commencera par remarquer que, étant donné une matrice  $P = (p_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,n}$ , nous avons pour tout  $1 \leq i, j \leq n$ ,

$$(PA)_i = p_{i1}A_1 + p_{i2}A_2 + \dots + p_{in}A_n = \sum_{k=1}^n p_{ik}A_k, \quad (2.6)$$

à savoir, l' $i$ -ème ligne de  $PA$  est obtenue par combinaison linéaire des lignes de  $A$  avec coefficients  $p_{i1}, \dots, p_{in}$ . Soient maintenant  $1 \leq i, j \leq n$  deux indices tels que  $i \neq j$ . La matrice de permutation  $P$  qui réalise l'échange  $A_i \leftrightarrow A_j$  doit satisfaire les conditions suivantes :

$$(PA)_i = A_j, \quad (PA)_j = A_i, \quad (PA)_l = A_l \quad \forall l \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}.$$

Par conséquent, les seuls éléments non nuls de  $P$  sont les suivants :

$$p_{ij} = 1, \quad p_{ji} = 1, \quad p_{ll} = 1 \quad \forall l \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}. \quad (2.7)$$

**Exercice 2.7** (Échange de deux lignes). On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 8 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 9 \end{pmatrix}.$$

Écrire la matrice de permutation  $P$  qui permet d'effectuer l'échange  $A_1 \leftrightarrow A_3$ , et vérifier le résultat. (Réponse :  $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ).

**Proposition 2.8** (Matrice de permutation de lignes). La matrice de permutation de lignes  $P$  définie par (2.7) est inversible et on a

$$P^{-1} = P^T = P.$$

*Démonstration.* Soit  $\tilde{A} = PA$  la matrice obtenue à partir de  $A$  en effectuant l'échange  $A_i \leftrightarrow A_j$  pour  $1 \leq i, j \leq n$  avec  $i \neq j$ . On vérifie aisément qu'on peut revenir à  $A$  à partir de  $\tilde{A}$  en effectuant l'échange de lignes  $\tilde{A}_i \leftrightarrow \tilde{A}_j$ , qui correspond à la matrice de permutation  $P = P^T$ . Nous avons donc

$$A = P\tilde{A} = P^T PA,$$

ce qui montre que  $P^T P = I_n$ , à savoir,  $P$  est inversible et  $P^{-1} = P^T = P$ .  $\square$

On peut appliquer un raisonnement similaire à la combinaison linéaire de deux lignes  $A_i \leftarrow \lambda A_i + \mu A_j$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ , avec  $i \neq j$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}_*$  et  $\lambda \neq 0$ . D'après (2.6), les seuls coefficients non nuls de la matrice  $P$  sont dans ce cas

$$p_{ii} = \lambda, \quad p_{ij} = \mu, \quad p_{ll} = 1 \quad \forall l \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i\}.$$

**Exercice 2.9** (Combinaison linéaire de deux lignes). Écrire la matrice  $P$  qui correspond à la combinaison linéaire  $A_1 \leftarrow 2A_1 + 3A_4$  pour la matrice de l'Exercice 2.7 et vérifier le résultat.

(Réponse :  $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ).

**Exercice 2.10** (Échange de deux colonnes). Soient  $1 \leq i, j \leq n$  avec  $i \neq j$ . Montrer que l'échange de colonnes

$$A_{\cdot i} \leftrightarrow A_{\cdot j}$$

peut s'interpréter comme la multiplication à droite par la matrice de permutation  $P = (p_{ij})$  dont les seuls éléments non nuls sont

$$p_{ij} = 1, \quad p_{ji} = 1, \quad p_{ll} = 1 \quad \forall l \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}.$$

(Suggestion : remarquer d'abord que, pour tout  $1 \leq l \leq n$ ,  $(AP)_{\cdot l} = A_{\cdot 1}p_{1l} + A_{\cdot 2}p_{2l} + \dots + A_{\cdot n}p_{nl}$ ).

## 2.3 Méthode de Gauss

### 2.3.1 Factorisation $A = LU$

Les résultats de la section précédente permettent d'interpréter la méthode du pivot de Gauss comme un factorisation de la matrice  $A$ . La stratégie de la méthode de Gauss consiste, à chaque itération  $1 \leq k \leq n-1$ , à éliminer la variable d'indice  $k$  des équations  $k+1 \dots n$  de la matrice en effectuant des combinaisons linéaires de lignes.

On se situe à l'itération  $k$  et on cherche à interpréter les opérations élémentaires correspondantes en termes de multiplication à gauche par des matrices opportunes. La matrice  $A^{(k)}$  prend la forme suivante :

$$A^{(k)} = \begin{pmatrix} U^{(k)} & A_{12}^{(k)} \\ A_{21}^{(k)} & A_{22}^{(k)} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{k+(n-k), k+(n-k)}, \quad (2.8)$$

avec

$$U^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & \cdots & a_{1k}^{(k)} \\ & \ddots & \vdots \\ & & a_{kk}^{(k)} \end{pmatrix}, \quad A_{21}^{(k)} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{k+1k}^{(k)} \\ 0 & \cdots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nk}^{(k)} \end{pmatrix}$$

On supposera pour l'instant que  $u_{kk} = a_{kk}^{(k)}$  (le *pivot*) est non nul. Notre objectif consiste à annuler les coefficients de la variable  $k$  dans les lignes  $k+1, \dots, n$  de  $A$ , à savoir, annuler l'unique colonne non nulle de  $A_{21}^{(k)}$ . Cela revient à effectuer les combinaisons linéaires suivantes :

$$A_{i:}^{(k+1)} \leftarrow A_{i:}^{(k)} - \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} A_{k:}^{(k)} \quad \forall i \in \llbracket k+1, n \rrbracket. \quad (2.9)$$

D'après (2.6), les seuls éléments non nuls de la matrice  $E^{(k)} = (e_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,n}$  telle que  $A^{(k+1)} = E^{(k)}A^{(k)}$  sont

$$\begin{aligned} e_{ii}^{(k)} &= 1 & \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ e_{ik}^{(k)} &= -\frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} & \forall i \in \llbracket k+1, n \rrbracket. \end{aligned} \quad (2.10)$$

La matrice  $E^{(k)}$  est donc de la forme

$$E^{(k)} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & -\frac{a_{k+1k}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} & 1 & & \\ & & \vdots & & \ddots & \\ 0 & & -\frac{a_{nk}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} & & & 1 \end{pmatrix}.$$

La nouvelle matrice  $A^{(k+1)} = E^{(k)}A^{(k)}$  est par construction telle que  $a_{ij}^{(k+1)} = 0$  pour tout  $j \in \llbracket 1, k+1 \rrbracket$  et  $1 \leq i < j$ . Un point important à noter est que la matrice  $E^{(k)}$  est triangulaire inférieure car, pour tout  $1 \leq i < j \leq n$  on a  $e_{ij}^{(k)} = 0$ . De plus, on a  $\text{diag}(E^{(k)}) = (1, \dots, 1)$ . En

supposant tous les pivots non nuls, à savoir,  $a_{kk}^{(k)} \neq 0$  pour tout  $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ , la méthode de Gauss s'écrit synthétiquement

$$E^{(n-1)} \dots E^{(1)} A = U \iff A = LU,$$

où nous avons posé  $L := (E^{(n-1)} \dots E^{(1)})^{-1}$  et  $U := A^{(n)} \in \mathbb{R}^{n,n}$  est une matrice triangulaire supérieure. La proposition suivante montre que la matrice  $L$  est obtenue au cours des itérations sans coût supplémentaire.

**Proposition 2.11** (Calcul du facteur  $L$ ). *Le facteur  $L \in \mathbb{R}^{n,n}$  est triangulaire inférieure et on a*

$$L = L^{(1)} \dots L^{(n-1)},$$

avec, pour tout  $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ ,  $L^{(k)} = (l_{ij}^{(k)}) := (E^{(k)})^{-1}$ , à savoir,

$$l_{ii}^{(k)} = 1 \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad l_{ik}^{(k)} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} \quad \forall i \in \llbracket k+1, n \rrbracket.$$

La matrice  $L^{(k)}$  prend donc la forme

$$L^{(k)} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ 0 & \ddots & & & & & \\ \vdots & \ddots & & & & & \\ \vdots & & 1 & & & & \\ \vdots & & \frac{a_{k+1,k}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} & 1 & & & \\ \vdots & & \vdots & 0 & \ddots & & \\ 0 & \dots & \frac{a_{nk}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = 2I_n - E^{(k)}.$$

*Démonstration.* Soit  $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ , et  $N, M \in \mathbb{R}^{n,n}$  telles que

$$M = E^{(k)} N,$$

à savoir,

$$M_{i:} \leftarrow N_{i:} - \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} N_{k:} \quad \forall i \in \llbracket k+1, n \rrbracket.$$

On commence par remarquer que  $N$  peut s'obtenir à partir de la matrice  $M$  en effectuant les combinaisons linéaires suivantes :

$$N_{i:} \leftarrow M_{i:} + \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} M_{k:} \quad \forall i \in \llbracket k+1, n \rrbracket.$$

où nous avons utilisé le fait que  $M_{k:} = N_{k:}$ . A partir de la formule (2.6) on vérifie aisément que la matrice correspondante est précisément  $L^{(k)}$ . Nous avons donc

$$M = E^{(k)} N = E^{(k)} L^{(k)} M, \quad N = L^{(k)} M = L^{(k)} E^{(k)} N. \quad (2.11)$$

En choisissant  $N$  inversible et en multipliant la deuxième relation de (2.11) à droite par  $N^{-1}$  on déduit que  $L^{(k)} E^{(k)} = I_n$ . Si  $N$  est inversible,  $M$  l'est aussi en tant que produit de deux



matrices inversibles ( $E^{(k)}$  est inversible car sa diagonale est formée de 1). En multipliant la première relation de (2.11) à droite par  $M^{-1}$ , on obtient  $E^{(k)}L^{(k)} = I_n$ . En conclusion, par la Définition 1.18 de matrice inverse, nous avons  $L^{(k)} = (E^{(k)})^{-1}$ . Enfin, de par la Proposition 1.9,  $L$  est triangulaire inférieure car produit de matrices triangulaires inférieures.  $\square$

**Proposition 2.12** (Expression pour  $L$ ). *Pour tout  $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$  on a*

$$\tilde{L}^{(k)} := L^{(1)} \dots L^{(k)} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & \\ \frac{a_{21}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} & \ddots & & & & & & & & \\ \vdots & \ddots & & & & & & & & \\ \vdots & & & & & & & & & \\ \vdots & & & & & & & & & \\ \frac{a_{n1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} & \dots & \frac{a_{nk}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} & & & & & & & \\ \frac{a_{11}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} & & \frac{a_{kk}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} & & & & & & & \end{pmatrix}.$$

**Exercice 2.13** (Factorisation  $LU$ ). *Calculer la factorisation  $LU$  de la matrice*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 8 & 11 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix},$$

*en précisant à chaque étape la matrice  $L^{(k)}$ . Vérifier que  $L = L^{(n-1)} \dots L^{(1)}$  est triangulaire inférieure et que  $LA^{(n)} = LU = A$ . (Réponse :  $L = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 4 & 1 & \\ 1 & 3/5 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $U = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & -5 & -9 \\ 0 & 0 & 32/5 \end{pmatrix}$ .)*

**Exercice 2.14** (Nombre d'opérations élémentaires). *Prouver que le nombre d'opérations élémentaires effectué pour accomplir la factorisation  $LU$  est de l'ordre de  $2n^3/3$  (on négligera les termes d'ordre inférieur).*

**Proposition 2.15** (Calcul du déterminant de  $A$ ). *Soit  $A$  une matrice admettant une factorisation  $LU$ . Alors,*

$$\det(A) = \det(U) = \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

*Démonstration.* On a  $\det(A) = \det(L)\det(U)$ . Puisque  $L$  et  $U$  sont triangulaires, leurs déterminants sont donnés par les produits des éléments diagonaux, à savoir  $\det(L) = 1$  et  $\det(U) = \prod_{i=1}^n u_{ii}$ , ce qui conclut la preuve.  $\square$

### 2.3.2 Existence et unicité de la factorisation $A = LU$

Dans la section précédente nous avons supposé que les pivots  $a_{kk}^{(k)}$ ,  $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$  étaient non nuls. Le théorème suivant fournit une condition suffisante pour que cette hypothèse soit vérifiée.

**Théorème 2.16** (Existence et unicité de la factorisation  $LU$ ). Soit  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,n}$  et posons, pour tout  $1 \leq k \leq n$ ,

$$\Delta^{(k)} := \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix}.$$

Si toutes les matrices  $\Delta^{(k)}$ ,  $1 \leq k \leq n-1$ , sont inversibles, alors il existe une unique factorisation  $A = LU$  avec  $U$  triangulaire supérieure et  $L$  triangulaire inférieure inversible ayant une diagonale de 1. Si, de plus,  $\Delta^{(n)} = A$  est inversible, la matrice  $U$  l'est aussi.

*Démonstration.* La preuve de l'existence et unicité se fait par récurrence sur la taille  $k$ .

**Initialisation.** Comme  $\Delta^{(1)} = a_{11}$  est un scalaire, on peut le factoriser de manière unique sous la forme  $\Delta^{(1)} = \mathfrak{L}^{(1)}\mathfrak{U}^{(1)}$  avec  $\mathfrak{L}^{(1)} = 1$  et  $\mathfrak{U}^{(1)} = a_{11}$ .

**Récurrence.** Supposons maintenant qu'il existe une unique factorisation  $\Delta^{(k-1)} = \mathfrak{L}^{(k-1)}\mathfrak{U}^{(k-1)}$ , et montrons qu'il existe une unique factorisation  $\Delta^{(k)} = \mathfrak{L}^{(k)}\mathfrak{U}^{(k)}$ . On doit avoir

$$\mathfrak{L}^{(k)}\mathfrak{U}^{(k)} = \Delta^{(k)} = \begin{pmatrix} \Delta^{(k-1)} & \Delta_{1:k-1,k}^{(k)} \\ \Delta_{k,1:k-1}^{(k)} & a_{kk} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(k-1)+1, (k-1)+1}, \quad (2.12)$$

avec facteurs de la forme

$$\mathfrak{L}^{(k)} = \begin{pmatrix} \mathfrak{L}_{11}^{(k)} & 0 \\ \mathfrak{l}_{21}^{(k)} & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(k-1)+1, (k-1)+1} \text{ et } \mathfrak{U}^{(k)} = \begin{pmatrix} \mathfrak{u}_{11}^{(k)} & \mathfrak{u}_{12}^{(k)} \\ 0 & \mathfrak{u}_{kk}^{(k)} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(k-1)+1, (k-1)+1}.$$

En imposant l'égalité (2.12) bloc par bloc, on obtient

$$\mathfrak{L}_{11}^{(k)}\mathfrak{u}_{11}^{(k)} = \Delta^{(k-1)} \quad (2.13a)$$

$$\mathfrak{L}_{11}^{(k)}\mathfrak{u}_{12}^{(k)} = \Delta_{1:k-1,k}^{(k)} \quad (2.13b)$$

$$\mathfrak{l}_{21}^{(k)}\mathfrak{u}_{11}^{(k)} = \Delta_{k,1:k-1}^{(k)} \quad (2.13c)$$

$$\mathfrak{l}_{21}^{(k)}\mathfrak{u}_{12}^{(k)} + \mathfrak{u}_{kk}^{(k)} = a_{kk}. \quad (2.13d)$$

Puisque la factorisation  $\Delta^{(k-1)} = \mathfrak{L}^{(k-1)}\mathfrak{U}^{(k-1)}$  est par hypothèse unique, (2.13a) implique

$$\mathfrak{L}_{11}^{(k)} = \mathfrak{L}^{(k-1)}, \quad \mathfrak{u}_{11}^{(k)} = \mathfrak{U}^{(k-1)}.$$

En outre, comme  $\det(\mathfrak{L}^{(k-1)}) = 1 \neq 0$ , (2.13b) détermine  $\mathfrak{u}_{12}^{(k)} \in \mathbb{R}^{k-1,1}$  de façon unique :

$$\mathfrak{u}_{12}^{(k)} = (\mathfrak{L}_{11}^{(k)})^{-1} \Delta_{1:k-1,k}^{(k)} = (\mathfrak{L}^{(k-1)})^{-1} \Delta_{1:k-1,k}^{(k)}.$$

D'autre part,  $\mathfrak{U}^{(k-1)}$  est aussi inversible car produit de deux matrices inversibles ( $\mathfrak{U}^{(k-1)} = (\mathfrak{L}^{(k-1)})^{-1} \Delta^{(k-1)}$ ), donc (2.13c) détermine  $\mathfrak{l}_{21}^{(k)} \in \mathbb{R}^{1,k-1}$  de façon unique :

$$\mathfrak{l}_{21}^{(k)} = \Delta_{k,1:k-1}^{(k)} (\mathfrak{u}_{11}^{(k)})^{-1} = \Delta_{k,1:k-1}^{(k)} (\mathfrak{U}^{(k-1)})^{-1}.$$

Enfin,  $\mathfrak{u}_{kk}^{(k)}$  est déterminé de façon unique par (2.13d) car tous les autres objets qui apparaissent dans cette expression le sont.

Ceci conclut la preuve d'existence et unicité de la factorisation  $LU$  de la matrice  $A$ . A noter que, pour l'existence et unicité de cette factorisation, nous n'avons pas eu recours à l'inversibilité de  $A$ , mais uniquement à celle des  $\Delta^{(k)}$  pour  $1 \leq k \leq n-1$ .

Venons maintenant à l'inversibilité de  $U$ . A l'issue de l'étape  $n-1$  de l'algorithme de Gauss, deux cas peuvent se produire : soit la matrice  $A$  est de rang  $(n-1)$ , et on a  $u_{nn} = a_{nn}^{(n-1)} = 0 \implies \det(U) = 0$ , soit la matrice  $A$  est de rang plein (ce qui équivaut à supposer  $\Delta^{(n)} = A$  inversible), et dans ce cas  $u_{nn} = a_{nn}^{(n-1)} \neq 0 \implies \det(U) \neq 0$  et  $U$  est inversible.  $\square$

**Proposition 2.17** (Existence et unicité de la factorisation  $LU$  pour une matrice SDP). *Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  SDP. Alors,  $A$  admet une unique factorisation  $LU$ .*

*Démonstration.* On vérifie les hypothèses du Théorème 2.16 en prouvant que, pour tout  $1 \leq k \leq n$ ,  $\Delta^{(k)}$  est SDP. La symétrie de  $\Delta^{(k)}$  découle immédiatement de celle de  $A$ . Il ne reste donc qu'à prouver que  $\Delta^{(k)}$  est défini positif. Soit  $x \in \mathbb{R}^n$  tel que

$$x = \begin{pmatrix} \bar{x} \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{k+(n-k)},$$

avec  $\bar{x} \in \mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ . On a que

$$0 < x^T A x = \begin{pmatrix} \bar{x}^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta^{(k)} & A_{1:k, k+1:n} \\ A_{k+1:n, 1:k} & A_{k+1:n, k+1:n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x} \\ 0 \end{pmatrix} = \bar{x}^T \Delta^{(k)} \bar{x}.$$

Le vecteur  $\bar{x}$  étant générique dans  $\mathbb{R}^k \setminus \{0\}$ , ceci montre que  $\Delta^{(k)}$  est défini positif.  $\square$

### 2.3.3 Pivoting partiel et factorisation $PA = LU$

La méthode présentée à la section précédente échoue lorsqu'un pivot nul est rencontré. Il est toutefois possible d'introduire une modification qui permet d'aboutir dans un plus grand nombre de cas. L'idée consiste, à chaque étape  $k$ , d'effectuer un échange de lignes pour assurer un pivot non nul. Soit  $A^{(k)}$  de la forme (2.8). Le *pivoting* partiel consiste à chercher l'indice  $l$  tel que

$$a_{lk}^{(k)} = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}|, \quad (2.14)$$

à savoir, on choisit le plus grand en valeur absolue entre  $a_{kk}^{(k)}$  et les éléments de la colonne  $k$  de  $A_{21}^{(k)}$ . On admettra par la suite qu'il existe un indice  $l$  tel que  $a_{lk}^{(k)} \neq 0$ . Comme on le verra plus loin, choisir le plus grand pivot en valeur absolue permet de réduire les erreurs d'arrondi associées à la méthode de Gauss. La nouvelle itération  $k$  consiste maintenant à effectuer deux opérations élémentaires, à savoir, l'échange de la ligne  $k$  avec la ligne  $l$  puis les combinaisons linéaires (2.9) :

$$A_{k:}^{(k)} \leftrightarrow A_{l:}^{(k)}, \quad (2.15)$$

$$A_{i:}^{(k+1)} \leftarrow A_{i:}^{(k)} - \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} A_{k:}^{(k)} \quad x \forall i \in \llbracket k+1, n \rrbracket. \quad (2.16)$$

Il faut bien noter que le pivot  $a_{kk}^{(k)}$  est non nul et que la matrice  $A^{(k)}$  qui apparaît dans (2.16) est celle obtenue *après* la permutation des lignes  $l$  et  $k$ . On vérifie aisément à l'aide de (2.6) que ces deux opérations s'écrivent de manière synthétique comme suit :

$$A^{(k+1)} = E^{(k)} P^{(k)} A^{(k)},$$

avec  $E^{(k)}$  définie par (2.10) et les seuls éléments non nuls de la matrice de permutation  $P^{(k)} = (p_{ij}^{(k)}) \in \mathbb{R}^{n,n}$  sont

$$p_{kl}^{(k)} = 1, \quad p_{lk}^{(k)} = 1, \quad p_{ii}^{(k)} = 1 \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{l, k\}. \quad (2.17)$$

Nous avons alors

$$U = A^{(n)} = E^{(n-1)} P^{(n-1)} \dots E^{(1)} P^{(1)} A.$$

En posant

$$P := P^{(n-1)} \dots P^{(1)}, \quad E := (E^{(n-1)} P^{(n-1)} \dots E^{(1)} P^{(1)}) P^{-1}, \quad L := E^{-1}$$

nous avons

$$U = EPA \iff LU = PA.$$

Une amélioration ultérieure (mais coûteuse) du *pivoting* consiste à autoriser des permutations de colonnes, et à chercher le pivot parmi *tous* les éléments de la matrice formée par la  $k$ -ième colonne de  $A_{21}^{(k)}$  et la sous-matrice  $A_{22}^{(k)}$  de (2.8). Voir l'Exercice 2.24 pour plus de détails.

### 2.3.4 Résolution de systèmes linéaires

La factorisation  $A = LU$  (ou  $PA = LU$ ) est utilisée notamment pour la résolution de systèmes linéaires. Une fois calculée la factorisation  $LU$  de la matrice  $A$ , on réécrit le système (2.1) comme deux systèmes triangulaires moyennant l'introduction de la variable auxiliaire  $y \in \mathbb{R}^n$  :

$$\begin{cases} Ly = b, \\ Ux = y. \end{cases} \quad (2.18)$$

La résolution d'un système triangulaire est particulièrement simple, car elle peut s'effectuer par substitutions successives. On parle alors de *remontée* si le système est triangulaire supérieur et de *descente* s'il est triangulaire inférieur. Pour fixer les idées, soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice triangulaire supérieure inversible, à savoir

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix},$$

où nous avons omis d'indiquer les éléments nuls. Puisque  $A$  est inversible et donc,  $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii} \neq 0$ , on a  $a_{ii} \neq 0$  pour tout  $1 \leq i \leq n$ . Alors,

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}, \quad x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left( b_i - \sum_{k=i+1}^n a_{ik} x_k \right) \quad \forall i = n-1, \dots, 1. \quad (2.19)$$

Il est utile de compter le nombre d'opérations élémentaires nécessaires pour la résolution complète du système. On a besoin d'une division pour calculer  $x_n$ , de  $n-i$  multiplications, de  $n-i$  sommes, et d'une division pour calculer  $x_i$ . Le nombre d'opérations élémentaires est donc

$$\begin{aligned}
 1 + \underbrace{\sum_{i=1}^{n-1} (n-i)}_{\text{multiplications}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{n-1} (n-i)}_{\text{sommes}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{n-1} 1}_{\text{divisions}} &= 1 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} n - 2 \sum_{i=1}^{n-1} i + (n-1) \\
 &= 1 + 2n(n-1) - n(n-1) + (n-1) = n^2.
 \end{aligned}$$

Comme la factorisation  $LU$  demande  $\approx 2n^3/3$  opérations élémentaires, on voit bien que le coût de résolution des deux systèmes (2.18) est négligeable lorsque  $n$  est suffisamment grand.

## 2.4 Matrices SDP : La factorisation de Cholesky

Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice SDP. D'après la Proposition 2.17, on sait qu'il existe une unique factorisation  $LU$  de  $A$ , et on peut poser

$$A = LU = LD(D^{-1}U) := LDM^T,$$

où  $D = \text{diag}((u_{ii})_{1 \leq i \leq n})$  contient la diagonale de  $U$  et  $M^T$  est une matrice triangulaire supérieure avec une diagonale de 1. L'existence de  $D^{-1}$  est garantie par l'inversibilité de  $A$ , qui assure  $\det(A) = \det(U) \neq 0$  (voir le Théorème 1.33 concernant le lien entre inversibilité et déterminant non nul et la Proposition 2.15 concernant l'égalité  $\det(A) = \det(U)$ ). Comme  $A$  est symétrique, on peut donc conclure que

$$LDM^T = A = A^T = MD^T L^T = MDL^T,$$

et, par l'unicité de la factorisation,  $M = L$ . De plus, comme  $A$  est SDP, on peut aisément démontrer que les éléments de la diagonale de  $D$  sont des réels positifs (exercice laissé au lecteur), et on peut définir

$$D^{\frac{1}{2}} := \text{diag}(\sqrt{d_{ii}}).$$

En posant  $H := L^T D^{\frac{1}{2}}$  ( $H$  est triangulaire supérieure) nous avons donc

$$A = H^T H. \tag{2.20}$$

Cette factorisation est appelée *de Cholesky*. Son calcul est détaillé dans le lemme suivant.

**Lemme 2.18** (Calcul de la factorisation de Cholesky). Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  SDP. Alors, il existe une unique factorisation (2.20) de  $A$  avec  $H$  triangulaire supérieure avec diagonale positive. Les éléments  $h_{ij}$  de  $H^T$  peuvent être calculés à partir des formules suivantes :  $h_{11} = \sqrt{a_{11}}$  et, pour tout,  $i = 2, \dots, n$ ,

$$h_{i1} = \frac{1}{h_{11}} a_{i1} \quad (2.21a)$$

$$\text{si } i \geq 3, \quad h_{ij} = \frac{1}{h_{jj}} \left( a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} h_{ik} h_{jk} \right) \quad j = 2, \dots, i-1, \quad (2.21b)$$

$$h_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} h_{ik}^2}. \quad (2.21c)$$

*Démonstration.* On raisonne par récurrence sur la taille  $i$  de la matrice.

**Initialisation.** Pour  $i = 1$  le résultat est clairement vrai.

**Récurrence.** Supposons-le vrai pour  $i-1$  et prouvons-le pour  $i$ . On considère l'écriture par blocs suivante pour la matrice  $A_i$  :

$$A_i = \begin{pmatrix} A_{i-1} & v \\ v^T & a_{ii} \end{pmatrix}$$

avec  $A_{i-1}$  de taille  $i-1$ . On vérifie aisément que  $A_{i-1}$  est définie positive. En effet, soit  $x \in \mathbb{R}^i$  tel que  $x = \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ 0 \end{pmatrix}$  avec  $\tilde{x} \in \mathbb{R}^{i-1} \setminus \{0\}$ . On a

$$0 < x^T A_i x = (\tilde{x}^T \quad 0) \begin{pmatrix} A_{i-1} & v \\ v^T & a_{ii} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ 0 \end{pmatrix} = (\tilde{x}^T \quad 0) \begin{pmatrix} A_{i-1} \tilde{x} \\ v^T \tilde{x} \end{pmatrix} = \tilde{x}^T A_{i-1} \tilde{x}.$$

D'après l'hypothèse de récurrence il existe donc une unique matrice  $H_{i-1}$  triangulaire supérieure telle que  $A_{i-1} = H_{i-1}^T H_{i-1}$ . Alors on cherche  $\beta \in \mathbb{R}$  et  $h \in \mathbb{R}^{i-1}$  tels que l'égalité par blocs suivante soit vérifiée :

$$A_i = \begin{pmatrix} A_{i-1} & v \\ v^T & a_{ii} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{i-1}^T & 0 \\ h^T & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_{i-1} & h \\ 0 & \beta \end{pmatrix} = H_i^T H_i,$$

où on remarquera que  $v \in \mathbb{R}^{i-1}$  et  $a_{ii}$  est un réel *strictement positif* (ceci est nécessaire pour que  $A_i$  soit définie positive). En imposant l'équivalence bloc par bloc on a les équations

$$H_{i-1}^T h = v, \quad (2.22a)$$

$$h^T h + \beta^2 = a_{ii}, \quad (2.22b)$$

où on remarquera que le vecteur  $h$  est unique car  $H_{i-1}$  est non singulière. De plus, comme  $A_i$  est SDP on a

$$0 < \det(A_i) = \det(H_i^T) \det(H_i) = \beta^2 \det(H_{i-1})^2,$$

et on conclut que  $\beta$  est un réel et  $\beta = \sqrt{a_{ii} - h^T h}$ . Les formules (2.21a)–(2.21b) ne sont rien d'autre que la descente pour le système triangulaire supérieur (2.22a) (voir l'Exercice 2.25 pour plus de détails), tandis que (2.21c) n'est rien d'autre que la formulation vectorielle de (2.22b).  $\square$

## 2.5 Matrices creuses

### 2.5.1 Matrices tridiagonales : La méthode de Thomas

Pour certaines matrices dotées d'une structure particulière la factorisation  $LU$  peut être obtenue avec un nombre d'opérations élémentaires significativement inférieur à celui de la méthode de Gauss. C'est le cas notamment des matrices tridiagonales de la forme

$$A = \text{tridiag}(c, a, b), \quad (2.23)$$

où  $a = (a_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n$ ,  $b = (b_i)_{1 \leq i \leq n-1} \in \mathbb{R}^{n-1}$  et  $c = (c_i)_{1 \leq i \leq n-1} \in \mathbb{R}^{n-1}$ . On supposera dans le reste de cette section que  $A$  est définie positive, ce qui assure la bonne définition de tous les termes qui apparaissent dans l'algorithme. Pour toute matrice tridiagonale définie positive de la forme (2.23) on a

$$A = LU, \quad L = \text{tridiag}(\gamma, 1, 0), \quad U = \text{tridiag}(0, \alpha, b),$$

avec  $\alpha = (\alpha_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n$  et  $\gamma = (\gamma_i)_{1 \leq i \leq n-1} \in \mathbb{R}^{n-1}$ . On vérifie aisément que

$$LU = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & b_1 \\ \gamma_{i-1}\alpha_{i-1} & \gamma_{i-1}b_{i-1} + \alpha_i & b_i \\ & \gamma_{n-1}\alpha_{n-1} & \gamma_{n-1}b_{n-1} + \alpha_n \end{pmatrix}$$

Les composantes des vecteurs  $\alpha$  et  $\gamma$  peuvent être calculées par comparaison de manière récursive selon le schéma suivant :

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & & b_1 \\ \downarrow & & \\ \gamma_{i-1}\alpha_{i-1} \rightarrow \gamma_{i-1}b_{i-1} + \alpha_i & & b_i \\ & \downarrow & \\ & \gamma_{n-1}\alpha_{n-1} \rightarrow \gamma_{n-1}b_{n-1} + \alpha_n \end{pmatrix}$$

Plus précisément on a  $\alpha_1 = a_1$  et, pour  $i = 1, \dots, n$ ,

$$\gamma_{i-1} = \frac{c_{i-1}}{\alpha_{i-1}}, \quad \alpha_i = a_i - \gamma_{i-1}b_{i-1}.$$

On voit facilement que le nombre d'opérations élémentaires nécessaires pour conclure le calcul des facteurs  $L$  et  $U$  est de l'ordre de  $3n$ . L'exemple suivant montre que l'intérêt de la méthode de Thomas n'est pas uniquement théorique.

**Exemple 2.19** (Discrétisation différences finies du problème de Poisson). Soit  $\Omega = (0, 1)$  et  $f \in C^0(\Omega, \mathbb{R})$ . On considère le problème de Poisson

$$-u'' = f \quad \text{dans } \Omega, \quad u(0) = u(1) = 0, \quad (2.24)$$

Ce problème peut être approché numériquement par la méthode des différences finie, consistante à remplacer les dérivées par des approximations construites à partir de la formule de Taylor. Soit  $N$  un entier  $\geq 1$ . On introduit la famille de points  $(x_i)_{0 \leq i \leq N+1}$  tels que  $x_i = ih$  avec

$h := 1/(N + 1)$  et, pour toute fonction  $\phi$  suffisamment régulière, on pose  $\phi_i := \phi(x_i)$ . Pour tout point intérieur  $x_i$ ,  $1 \leq i \leq N$ , en supposant  $\phi \in C^2(\bar{\Omega}, \mathbb{R})$ , la formule de Taylor donne

$$\phi_{i-1} = \phi_i - \phi'_i h + \phi''_i \frac{h^2}{2} + o(h^2), \quad \phi_{i+1} = \phi_i + \phi'_i h + \phi''_i \frac{h^2}{2} + o(h^2).$$

En sommant les deux égalités ci-dessus on trouve

$$\phi_{i-1} + \phi_{i+1} = 2\phi_i + \phi''_i h^2 + o(h^2) \iff \phi''_i = \frac{\phi_{i-1} - 2\phi_i + \phi_{i+1}}{h^2} + \frac{o(h^2)}{h^2}.$$

En négligeant le reste dans l'expression de  $\phi''_i$  on obtient une approximation consistante de la dérivée seconde de  $\phi$  au sens où, pour tout  $1 \leq i \leq N$ ,

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \left( \phi''_i - \frac{\phi_{i-1} - 2\phi_i + \phi_{i+1}}{h^2} \right) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{o(h^2)}{h^2} = 0.$$

On peut donc approcher le problème (2.24) comme suit :

$$-\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = f_i \quad \forall 1 \leq i \leq N, \quad u_0 = u_{N+1} = 0, \quad (2.25)$$

où les inconnues  $(u_i)_{0 \leq i \leq N+1}$  représentent des valeurs nodales. La résolution du problème (2.25) demande l'inversion d'une matrice tridiagonale pour déterminer les inconnues  $u_i$ ,  $1 \leq i \leq N$ , associées aux nœuds intérieurs. Cette matrice prend la forme

$$A = \frac{1}{h^2} \text{tridiag}(-1, 2, -1).$$

Dans l'Exercice 2.21 nous allons montrer que le conditionnement de la matrice  $A$  se comporte asymptotiquement comme  $1/h^2$ . De ce fait, la résolution du système linéaire (2.25) demande la mise en place de stratégies permettant de limiter l'impact du conditionnement croissant sur les erreurs de troncature lorsqu'on effectue des études de convergence (c.-à-d., on résout pour des valeurs de  $h$  de plus en plus petites).



## 2.6 Exercices

**Exercice 2.20** (Conditionnement). Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  une matrice inversible. Prouver que

- (i) si  $\|\cdot\|$  est une norme matricielle subordonnée, alors  $\text{cond}(A) = \text{cond}(A^{-1}) \geq 1$ ,  $\text{cond}(\alpha A) = \text{cond}(A)$  pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}^*$ ;
- (ii)  $\text{cond}_2(A) = \sigma_{\max}(A)/\sigma_{\min}(A)$  où  $\sigma_{\min}(A)$  et  $\sigma_{\max}(A)$  sont respectivement la plus petite et la plus grande valeur singulière de  $A$ ;
- (iii) si  $A$  est normale,  $\text{cond}_2(A) = |\lambda_{\max}(A)|/|\lambda_{\min}(A)|$  où  $\lambda_{\min}(A)$  et  $\lambda_{\max}(A)$  sont respectivement la plus petite et la plus grande valeur propre en module de  $A$ ;
- (iv) pour toute matrice unitaire  $U$ ,  $\text{cond}_2(U) = 1$  et  $\text{cond}_2(AU) = \text{cond}_2(UA) = \text{cond}_2(A)$ .

(i) On commence par remarquer que  $\text{cond} A^{-1} = \|(A^{-1})^{-1}\| \|A^{-1}\| = \|A\| \|A^{-1}\| = \text{cond} A$ . Ensuite, puisque  $\|\cdot\|$  est subordonnée, nous avons

$$1 = \|I_n\| = \|A^{-1}A\| \leq \|A^{-1}\| \|A\|_2 = \text{cond}(A),$$

à savoir,  $\text{cond}(A) \geq 1$ . D'autre part, comme

$$\|\alpha A\| = \sup_{x \in \mathbb{C}^n, \|x\|=1} \|\alpha Ax\| = |\alpha| \sup_{x \in \mathbb{C}^n, \|x\|=1} \|Ax\| = |\alpha| \|A\|,$$

et que  $(\alpha A)^{-1} = \alpha^{-1}A^{-1}$ , nous avons d'après l'Exercice 1.63,

$$\text{cond}(\alpha A) = \|\alpha A\| \|(\alpha A)^{-1}\| = |\alpha| \|A\| \frac{1}{|\alpha|} \|A^{-1}\| = \text{cond}(A).$$

(ii) On peut diagonaliser  $A$  à l'aide de deux matrices unitaires  $U, V \in \mathbb{C}^{n,n}$  (cf. Theorem 1.40) comme suit :

$$U^H AV = \Sigma := \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n).$$

Comme  $U$  et  $V$  sont unitaires nous avons que  $\|U^H AV\|_2 = \|A\|_2$  et  $\|(U^H AV)^{-1}\|_2 = \|V^H A^{-1}U\|_2 = \|A^{-1}\|_2$ . Par conséquent,

$$\text{cond}_2(\Sigma) = \text{cond}_2(U^H AV) = \|U^H AV\|_2 \|(U^H AV)^{-1}\|_2 = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \text{cond}_2(A).$$

D'autre part, puisque  $\Sigma$  est diagonal,  $\text{cond}_2(\Sigma) = \sigma_{\max}(A)/\sigma_{\min}(A)$ , ce qui conclut la preuve.

(iii) Puisque  $A$  est normale, de par le Lemme 1.37 elle admet une décomposition de la forme

$$W^H AW = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1(A), \dots, \lambda_n(A)),$$

avec  $W$  matrice unitaire. Par conséquent,  $A = W \Lambda W^H$  et

$$AA^H = A^H A = (W \Lambda W^H)^H (W \Lambda W^H) = W \Lambda^H W^H W \Lambda W^H = W \Lambda^H \Lambda W^H,$$

à savoir,  $\lambda_i(A^H A) = \overline{\lambda_i(A)} \lambda_i(A) = |\lambda_i(A)|^2$ . Pour s'en convaincre, il suffit de multiplier à droite l'inégalité ci-dessus par  $W$  et utiliser le fait que  $W^H W = I_n$ , ce qui donne

$$AA^H W = W \text{diag}(|\lambda_1(A)|^2, \dots, |\lambda_n(A)|^2).$$

On remarquera aussi que les colonnes de  $W$  sont des vecteurs propres de  $AA^H$ . De par la Proposition 1.41 on a, de plus, que  $\sigma_i(A)^2 = \lambda_i(A^H A) = |\lambda_i(A)|^2$ , ce qui permet de conclure.

(iv) Conséquence de l'Exercice 1.63.

**Exercice 2.21** (Conditionnement de la matrice de l'Exemple 2.19). *L'objectif de cet exercice est d'étudier le conditionnement de la matrice  $A$  définie dans l'Exemple 2.19 en fonction de sa taille.*

(i) Spectre. Vérifier que les valeurs propres de la matrice sont

$$\lambda_k = \frac{4}{h^2} \sin^2\left(\frac{k\pi}{2(N+1)}\right) \quad 1 \leq k \leq N,$$

avec vecteurs propres

$$u^k = (u_i^k)_{1 \leq i \leq N} = \left( \sin\left(\frac{ik\pi}{N+1}\right) \right)_{1 \leq i \leq N}.$$

(ii) Conditionnement. Préciser le comportement asymptotique du conditionnement de la matrice  $A$  en norme  $\|\cdot\|_2$  pour  $h$  petit.

**(i) Spectre.** On a pour tout  $1 \leq k \leq N$  et tout  $1 \leq i \leq N$ , en rappelant que nous avons posé par convention  $u_0^k = \sin(0) = 0$  (relation utile pour  $i = 1$ ) et  $u_{N+1}^k = \sin(k\pi) = 0$  (relation utile pour  $i = N$ ),

$$\begin{aligned} (Au^k)_i &= \frac{1}{h^2} (-u_{i-1}^k + 2u_i^k - u_{i+1}^k) \\ &= \frac{1}{h^2} \left( -\sin\left(\frac{(i-1)k\pi}{N+1}\right) + 2\sin\left(\frac{ik\pi}{N+1}\right) - \sin\left(\frac{(i+1)k\pi}{N+1}\right) \right). \end{aligned}$$

Remarquons, maintenant, que

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{(i-1)k\pi}{N+1}\right) + \sin\left(\frac{(i+1)k\pi}{N+1}\right) &= \sin\left(\frac{ik\pi}{N+1} - \frac{k\pi}{N+1}\right) + \sin\left(\frac{ik\pi}{N+1} + \frac{k\pi}{N+1}\right) \\ &= 2\sin\left(\frac{ik\pi}{N+1}\right)\cos\left(\frac{k\pi}{N+1}\right), \end{aligned}$$

où nous avons utilisé l'identité trigonométrique  $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2\sin(\alpha)\cos(\beta)$ . Ceci nous permet d'écrire


$$(Au^k)_i = \frac{2}{h^2} \left( 1 - \cos\left(\frac{k\pi}{N+1}\right) \right) \sin\left(\frac{ik\pi}{N+1}\right) = \frac{4}{h^2} \sin^2\left(\frac{k\pi}{2(N+1)}\right) \sin\left(\frac{ik\pi}{N+1}\right) = \lambda_k u_i^k,$$

où nous avons utilisé l'identité trigonométrique  $\sin^2(\alpha) = (1 - \cos(2\alpha))/2$ . Nous avons donc vérifié que  $\lambda_k$  est valeur propre de la matrice  $A$  et que  $u^k$  est un vecteur propre associé. Puisque nous avons trouvé  $N$  valeurs propres distinctes, nous avons trouvé l'intégralité du spectre de  $A$ .

**(ii) Conditionnement.** La fonction sinus est strictement croissante dans l'intervalle  $[0, \pi/2]$ . Comme pour tout entier  $1 \leq k \leq N$  nous avons  $\frac{k}{N+1} \frac{\pi}{2} \in (0, \pi/2)$ , on peut conclure que  $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N$ . De plus, comme la matrice  $A$  est symétrique et définie positive (car ses valeurs propres sont des réels strictement positifs), nous avons (voir l'Exercice 2.20) :

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\lambda_N}{\lambda_1} = \frac{\sin^2\left(\frac{(1-h)\pi}{2}\right)}{\sin^2\left(h\frac{\pi}{2}\right)} \sim \frac{1}{h^2}.$$

**Exercice 2.22** (Factorisation  $PA = LU$ ). Donner l'expression de  $A := H(4)$  avec  $H(4)$  matrice de Hilbert d'ordre 4 (voir l'Exercice 1.54) et calculer sa décomposition  $PA = LU$  en effectuant un pivoting partiel. Estimer le conditionnement  $\text{cond}_2(A)$ . Les matrices de Hilbert sont un exemple classique de matrices mal conditionnées, comme le montre la figure suivante où on trace une estimation du conditionnement de  $H(n)$  en fonction de  $n$  :



**Factorisation  $PA = LU$ .** On a

$$A^{(1)} := H(4) = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 \end{pmatrix}.$$

Les étapes de la factorisation de Gauss sont données ci-dessous. Par brévit  seuls les  l ments non nuls des matrices  $A^{(k)}$ ,  $E^{(k)}$  et  $P^{(k)}$  sont affich s. Le pivot satisfaisant la condition (2.14) est contourn  par un rectangle.

$$L^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 1/2 & 1 & & \\ 1/3 & & 1 & \\ 1/4 & & & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{(1)} = I_n, \quad A^{(2)} = E^{(1)}P^{(1)}A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ \boxed{1/12} & 1/12 & 3/40 & \\ 1/12 & 4/45 & 1/12 & \\ 3/40 & 1/12 & 9/112 & \end{pmatrix},$$

$$L^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & 9/10 & & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{(2)} = I_n, \quad A^{(3)} = E^{(2)}P^{(2)}A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/12 & 1/12 & 3/40 & \\ & 1/180 & 1/120 & \\ & \boxed{1/120} & 9/700 & \end{pmatrix},$$

$$L^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & 2/3 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{(4)} = E^{(3)}P^{(3)}A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/12 & 1/12 & 3/40 & \\ & 1/120 & 9/700 & \\ & & & 1/4200 \end{pmatrix}.$$

On a donc  $PA = LU$  avec

$$P = P^{(3)}, \quad L = PL^{(1)}P^{(1)}L^{(2)}P^{(2)}L^{(3)}P^{(3)}, \quad U = A^{(4)}.$$

En utilisant les résultats énoncés dans les Propositions 2.8 et 2.11 pour le calcul de  $(P^{(k)})^{-1}$  et  $(L^{(k)})^{-1}$  on obtient

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 1/2 & 1 & & \\ 1/4 & 9/10 & 1 & \\ 1/3 & 1 & 2/3 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Estimation du conditionnement.** Comme  $A$  est symétrique, la formule (2.2) donne  $\text{cond}_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2$  et

$$\frac{1}{n} \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty \leq \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 \leq n \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty,$$

où nous avons utilisé le fait que  $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_\infty$  dans la dernière estimation. L'inverse  $A^{-1}$  peut être calculée en utilisant la factorisation  $PA = LU$  pour résoudre le système suivant

$$AA^{-1} = I_n \iff PAA^{-1} = P \iff LUA^{-1} = P \iff \begin{cases} LY = P \\ UA^{-1} = Y \end{cases}$$

On obtient numériquement  $\|A\|_\infty \approx 2.08 \cdot 10^0$  et  $\|A^{-1}\|_\infty \approx 1.36 \cdot 10^4$ , à savoir,  $1.42 \cdot 10^4 \leq \text{cond}_2(A) \leq 5.67 \cdot 10^4$ .

**Exercice 2.23** (Factorisation de Cholesky). *Calculer la factorisation de Cholesky de la matrice suivante :*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 8 & 12 & 16 \\ 3 & 12 & 27 & 30 \\ 4 & 16 & 30 & 37 \end{pmatrix}.$$

*Proposer un critère pour arrêter la méthode de Cholesky si la matrice n'est pas définie positive.*

La factorisation cherchée est de la forme

$$A = H^T H, \quad H^T = \begin{pmatrix} h_{11} & 0 & & \\ h_{21} & h_{22} & & \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} & \\ h_{41} & h_{42} & h_{43} & h_{44} \end{pmatrix}.$$

Les étapes du calcul des éléments de  $H^T$  sont détaillées ci-dessous en utilisant la notation de la formule (2.21).

$$\left( \begin{array}{l} \sqrt{a_{11}} = 1 \\ \downarrow \\ \frac{a_{21}}{h_{11}} = 2 \rightarrow \sqrt{a_{22} - h_{21}^2} = 2 \\ \downarrow \\ \frac{a_{31}}{h_{11}} = 3 \rightarrow \frac{a_{32} - h_{31}h_{21}}{h_{22}} = 3 \rightarrow \sqrt{a_{33} - h_{31}^2 - h_{32}^2} = 3 \\ \downarrow \\ \frac{a_{41}}{h_{11}} = 4 \rightarrow \frac{a_{42} - h_{41}h_{21}}{h_{22}} = 4 \rightarrow \frac{a_{43} - h_{41}h_{31} - h_{42}h_{32}}{h_{33}} = 2 \rightarrow \sqrt{a_{44} - h_{41}^2 - h_{42}^2 - h_{43}^2} = 1 \end{array} \right)$$

On peut arrêter la factorisation de Cholesky si on trouve la racine carré d'un nombre négatif pendant le calcul d'un élément diagonal.

**Exercice 2.24** (Pivoting total). On considère une version alternative de la procédure de pivoting décrite dans la Section 2.3.3 où on étend la recherche du meilleur pivot à toute la sous-matrice d'indices  $k \leq i, j \leq n$ , à savoir

$$a_{lm}^{(k)} = \max_{k \leq i, j \leq n} |a_{ik}^{(k)}|.$$

Montrer que cette stratégie, dite de pivoting total, équivaut à trouver une factorisation de la forme  $PAQ = LU$ ,  $P$  et  $Q$  étant deux matrices de permutation.

**Exercice 2.25** (Descente pour un système triangulaire inférieure). Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice triangulaire inférieure inversible, à savoir

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & \\ \vdots & & \ddots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & \end{pmatrix}.$$

Prouver des formules analogues à (2.19) pour la résolution du système  $Ax = b$ ,  $b \in \mathbb{R}^n$ .

On trouve

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}} \quad x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left( b_i - \sum_{k=1}^{i-1} a_{ik} x_k \right) \quad \forall i = 2, \dots, n-1. \quad (2.26)$$

**Exercice 2.26** (Méthode de Gram-Schmidt). Soit  $n \geq 1$  un entier et  $X := (x_i)_{1 \leq i \leq n}$  une famille de vecteurs libre de  $\mathbb{R}^m$ ,  $m \geq 1$ . On considère la famille de vecteurs  $Y := (y_i)_{1 \leq i \leq n}$  obtenue à partir de  $X$  comme suit :

$$y_1 = x_1, \quad y_{i+1} = x_{i+1} - \sum_{j=1}^i \frac{(x_{i+1}, y_j)}{\|y_j\|_2^2} y_j \quad \forall 1 \leq i \leq n-1, \quad (2.27)$$

où par brévit  nous avons not  le produit interne canonique de  $\mathbb{R}^m$   $(\cdot, \cdot)$  au lieu de  $(\cdot, \cdot)_{\mathbb{R}^m}$ . Montrer que  $Y$  est une famille libre et orthogonale,   savoir

$$(y_i, y_j) = \begin{cases} \|y_i\|_2^2 \neq 0 & \text{si } j = i, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Proposer une modification de l'algorithme permettant d'obtenir une famille orthonormale,   savoir telle que  $\|y_i\|_2 = 1$  pour tout  $1 \leq i \leq n$ .

On prouve le r sultat par r currence sur la taille  $n$  de la famille. Si  $n = 1$  la famille  $Y$  est orthogonale car la famille  $X$  est libre (ce qui implique, en particulier  $\|y_1\|_2 \neq 0$ ). Supposons la propri t  v rifi e pour  $n-1$  et prouvons-l  pour  $n$ . Soit  $\tilde{X} = (x_i)_{1 \leq i \leq n-1}$  et  $\tilde{Y} = (y_i)_{1 \leq i \leq n-1}$

obtenue en appliquant l'algorithme (2.27). La famille  $\tilde{Y}$  est orthogonale par l'hypothèse de récurrence. On a

$$y_n = x_n - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{(x_n, y_j)}{\|x_n\|_2^2} y_j.$$

En multipliant scalairement l'égalité précédente par  $y_i$ ,  $1 \leq i \leq n-1$  on obtient

$$(y_n, y_i) = (x_n, y_i) - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{(y_j, x_n)}{\|x_n\|_2^2} (y_j, y_i) = (x_n, y_i) - \frac{(y_i, x_n)}{\|y_i\|_2^2} (y_i, y_i) = 0,$$

ce qui montre que  $y_n$  est orthogonale aux vecteurs de  $\tilde{Y}$ . De plus, la famille  $Y$  est libre, car sinon on pourrait exprimer  $x_n$  comme combinaison linéaire des vecteurs de  $\tilde{X}$  (ce qui est absurde car  $X$  est libre par hypothèse). Pour obtenir une famille orthonormale il suffit de diviser chaque vecteur de  $Y$  par sa norme euclidienne. On obtient ainsi l'algorithme suivant :

$$y_1 = x_1, \quad \tilde{y}_{i+1} = x_{i+1} - \sum_{j=1}^i \frac{(x_{i+1}, y_j)}{\|y_j\|_2^2} y_j, \quad y_{i+1} = \frac{\tilde{y}}{\|\tilde{y}\|_2} \quad \forall 1 \leq i \leq n-1,$$

# Chapitre 3

## Méthodes itératives

Dans ce chapitre nous allons présenter quelques exemples de méthode *itératives* pour la résolution du système linéaire

$$Ax = b. \quad (3.1)$$

Nous allons nous restreindre au cas où  $A$  est une matrice carrée (réelle ou complexe) inversible et  $b$  un vecteur non nul. Contrairement aux méthodes directes, les méthodes itératives ne fournissent pas en général la solution exacte du système linéaire : elles consistent à engendrer une suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de solutions approchées qui tend vers  $x$ . Pour que les méthodes itératives soient intéressantes, deux conditions doivent être remplies :

- (i) la génération d'un nouvel élément de la suite à partir du (des) précédent(s) est significativement moins coûteuse que résoudre le système linéaire par une méthode directe;
- (ii) le nombre d'itérations  $n$  nécessaires pour arriver à un élément  $x_n$  qui approche  $x$  à la précision souhaitée est «petit».

### 3.1 Méthodes de point fixe

La première famille de méthodes que nous allons considérer repose sur la caractérisation de la solution du système linéaire (3.1) comme point fixe d'une fonction obtenue à partir de la matrice  $A$  et du second membre  $b$ .

#### 3.1.1 Formulation abstraite basée sur une décomposition régulière

Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  une matrice inversible,  $b \in \mathbb{C}^n$  non nul, et  $P, N \in \mathbb{C}^{n,n}$  deux matrices telles que

$$A = P - N \text{ et } P \text{ est facilement inversible.} \quad (3.2)$$

Une décomposition de la forme (3.2) est dite *régulière*. On vérifie aisément que la solution du système est point fixe de la fonction  $\Phi : y \rightarrow P^{-1}Ny + P^{-1}b$ . En effet,

$$Ax = (P - N)x = b \iff x = P^{-1}Nx + P^{-1}b = \Phi(x). \quad (3.3)$$

Cette remarque nous conduit à considérer la méthode itérative suivante : Pour tout  $k \geq 0$ ,

$$x^{(k+1)} = P^{-1}Nx^{(k)} + P^{-1}b = \Phi(x^{(k)}), \quad (3.4)$$

avec  $x^{(0)} \in \mathbb{C}^n$  estimation initiale. A chaque itération de la méthode (3.4) on résout un système linéaire de matrice  $P$ , ce qui justifie l'hypothèse que  $P$  soit facile à inverser. Par exemple, si on choisit  $P$  diagonale ou triangulaire, le coût lié à l'inversion sera de l'ordre de  $n$  ou  $n^2$  opérations respectivement.

**Remarque 3.1** (Hypothèse sur  $P$ ). *Nous avons supposé dans (3.2)  $P$  facilement inversible. En effet, le choix  $A = P$  (qui est toujours possible car  $A$  est inversible) donne une méthode itérative qui converge en une itération, mais dont la complexité équivaut à celle de la résolution du système linéaire  $Ax = b$ . Le choix de  $P$  doit donc représenter un compromis qui garantisse que le coût d'inversion de  $P$  à chaque itération reste raisonnable tout en évitant que le nombre d'itérations pour arriver à convergence explose.*

Le résultat suivant est une conséquence naturelle de l'interprétation de la méthode (3.4) comme recherche d'un point fixe.

**Lemme 3.2** (Condition nécessaire et suffisante pour la convergence de la méthode (3.4)). *La méthode (3.4) converge pour toute estimation initiale  $x^{(0)}$  vers l'unique solution  $x$  du système linéaire (3.1) si et seulement si  $\rho(P^{-1}N) < 1$ .*

*Démonstration.* Pour tout  $k \geq 0$ , soit  $e^{(k)} := x^{(k)} - x$  l'erreur associée à l'estimation  $x^{(k)}$ . De par (3.3) et (3.4) nous avons pour  $k \geq 1$ ,

$$e^{(k)} = x^{(k)} - x = \Phi(x^{(k-1)}) - \Phi(x) = P^{-1}N(x^{(k-1)} - x) = P^{-1}Ne^{(k-1)} = (P^{-1}N)^k e^{(0)}. \quad (3.5)$$

**(i)  $\rho(P^{-1}N) < 1 \implies$  convergence pour tout  $x^{(0)}$ .** Comme  $\rho(P^{-1}N) < 1$ , il existe une norme matricielle subordonnée  $\|\cdot\|$  telle que  $\|P^{-1}N\| < 1$  (il s'agit d'une conséquence du Lemme 1.50). En prenant la norme de (3.5) on obtient

$$\|e^{(k)}\| = \|(P^{-1}N)^k e^{(0)}\| \leq \|(P^{-1}N)^k\| \|e^{(0)}\| \leq \|P^{-1}N\|^k \|e^{(0)}\|, \quad (3.6)$$

où nous avons utilisé la Proposition 1.47 dans la première inégalité et le point (iii) de la Proposition 1.49 pour écrire  $\|(P^{-1}N)^k\| \leq \|P^{-1}N\|^k$ . Si  $\|P^{-1}N\| < 1$ , le seconde membre de (3.6) tend vers 0 lorsque  $k \rightarrow +\infty$  et donc la méthode converge pour tout  $x^{(0)}$ .

**(ii) Convergence pour tout  $x^{(0)} \implies \rho(P^{-1}N) < 1$ .** Supposons maintenant que la méthode converge pour toute estimation initiale  $x^{(0)}$ . Soit  $\|\cdot\|$  une norme vectorielle et  $\|\cdot\|$  la norme matricielle subordonnée. Soit  $\lambda$  la plus grande valeur propre en valeur absolue de  $P^{-1}N$  et  $x_\lambda$  vecteur propre associé avec  $\|x_\lambda\| = 1$ . On considère la méthode avec estimation initiale  $x^{(0)}$  telle que  $e^{(0)} := x^{(0)} - x = x_\lambda$ . De par (3.5), nous avons que

$$e^{(k)} = (P^{-1}N)^k e^{(0)} = (P^{-1}N)^k x_\lambda = \lambda^k x_\lambda.$$

Prenant la norme de l'expression précédente,

$$\|e^{(k)}\| = |\lambda|^k.$$

Comme la méthode converge,  $\|e^{(k)}\| \rightarrow 0$  lorsque  $k \rightarrow +\infty$ , ce qui implique  $\rho(P^{-1}N) = |\lambda| < 1$ .  $\square$



**Remarque 3.3** (Choix de la norme dans la preuve du Lemme 3.2). *Dans la preuve du Lemme 3.2 nous avons utilisé une norme  $\|\cdot\|$  subordonnée satisfaisant la condition  $\|P^{-1}N\| < 1$ . Cependant, comme que  $e^{(k)} \rightarrow 0 \in \mathbb{R}^n$  pour  $k \rightarrow +\infty$ , pour toute norme  $\|\cdot\|_*$  sur  $\mathbb{R}^n$ , nous avons  $\|e^{(k)}\|_* \rightarrow 0$  lorsque  $k \rightarrow +\infty$ .*

La condition du Lemme 3.2 est optimale mais difficile à vérifier en pratique. Une condition suffisante souvent plus simple à prouver est identifiée dans le lemme suivant.

**Lemme 3.4** (Condition suffisante pour la convergence de la méthode (3.4)). *Soit  $A \in \mathbb{C}^{n,n}$  hermitienne définie positive. On considère une décomposition régulière de la forme (3.2) avec  $P \neq A$  et  $P^H + N$  définie positive. Alors la méthode (3.4) converge vers la solution de (3.1).*

*Démonstration.* On commence par remarquer que

$$P^H + N = P^H + P - A. \quad (3.7)$$

Considérons maintenant la norme matricielle  $\|\cdot\|_A$  subordonnée à la norme vectorielle définie par le produit scalaire  $(x, y)_A := (Ax, y)_{\mathbb{C}^n}$  (que l'on notera toujours  $\|\cdot\|_A$ ). De par la Proposition 1.49, il existe  $y \in \mathbb{C}^n$  tel que  $\|y\|_A = (Ay, y)_{\mathbb{C}^n} = 1$  et  $\|P^{-1}N\|_A = \|P^{-1}Ny\|_A$ . Nous avons alors

$$\begin{aligned} & \|P^{-1}N\|_A^2 \\ &= \|P^{-1}Ny\|_A^2 \\ &= (AP^{-1}Ny, P^{-1}Ny)_{\mathbb{C}^n} \\ &= (AP^{-1}(P-A)y, P^{-1}(P-A)y)_{\mathbb{C}^n} && (N = P - A) \\ &= ((A - AP^{-1}A)y, (I_n - P^{-1}A)y)_{\mathbb{C}^n} \\ &= (Ay, y)_{\mathbb{C}^n} - (AP^{-1}Ay, y)_{\mathbb{C}^n} - (Ay, P^{-1}Ay)_{\mathbb{C}^n} + (AP^{-1}Ay, P^{-1}Ay)_{\mathbb{C}^n} \\ &= 1 - (Az, A^{-1}Pz)_{\mathbb{C}^n} - (Pz, z)_{\mathbb{C}^n} + (Az, z)_{\mathbb{C}^n} && (z := P^{-1}Ay) \\ &= 1 - (P^H z, z)_{\mathbb{C}^n} - (Pz, z)_{\mathbb{C}^n} + (Az, z)_{\mathbb{C}^n} && (A^H = A) \\ &= 1 - ((P^H + P - A)z, z)_{\mathbb{C}^n} = 1 - ((P^H + N)z, z)_{\mathbb{C}^n} < 1, && (3.7) \end{aligned}$$

où nous avons utilisé le fait que  $P^{-1}A$  est une matrice de rang plein et  $y \neq 0$  pour conclure que  $z \neq 0$  et le caractère défini positif de  $P^H + N$  pour en déduire  $((P^H + N)z, z)_{\mathbb{C}^n} > 0$ .  $\square$

On conclut cette section en observant qu'une généralisation de (3.4) consiste à considérer des méthodes de la forme

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f,$$

où  $B \in \mathbb{C}^{n,n}$  est dite *matrice d'itération* et  $f$  est obtenu à partir du second membre  $b$ . Dans ce cas, la consistance de la méthode est garantie si en posant  $x^{(k)} = x$  on trouve  $x^{(k+1)} = x$ , à savoir,

$$x = Bx + f, \quad (3.8)$$

et la solution exacte est un point fixe de  $\Phi(y) = By + f$ . Pour une méthode consistante on a

$$e^{(k)} = x^{(k)} - x = (Bx^{(k-1)} - f) - (Bx - f) = B(x^{(k-1)} - x) = Be^{(k-1)} = B^k e^{(0)}. \quad (3.9)$$

La condition nécessaire et suffisante pour la convergence de la méthode est donc

$$\rho(B) < 1. \quad (3.10)$$

### 3.1.2 Les méthodes de Jacobi et Gauss–Seidel

Les méthodes de Jacobi et Gauss–Seidel sont obtenues à partir de la décomposition suivante de la matrice  $A$  (décomposition DEL) :

$$A = D - E - L, \quad (3.11)$$

où  $D$  est la diagonale de  $A$ ,  $-E$  sa portion strictement triangulaire supérieure, et  $-L$  sa portion strictement triangulaire inférieure.

**Exemple 3.5** (Décomposition DEL). *La décomposition DEL de la matrice suivante :*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 7 & 1 & 2 \\ 8 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

est

$$D = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} -3 & -1 & \\ & -2 & \\ & & \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} & & \\ -7 & & \\ -8 & -1 & \end{pmatrix}.$$

La méthode de Jacobi est obtenue avec  $P = D$  et  $N = E + L$ . A l'itération  $k + 1$  la mise à jour est effectuée en posant

$$x^{(k+1)} = D^{-1}(E + L)x^{(k)} + D^{-1}b. \quad (3.12)$$

La matrice d'itération correspondante est

$$B_J = D^{-1}(E + L) = I - D^{-1}A. \quad (3.13)$$

Une condition suffisante pour la convergence de la méthode de Jacobi simple à vérifier est énoncée dans l'Exercice 3.15. Une variante de la méthode de Jacobi consiste à définir  $x^{(k+1)}$  comme une moyenne pondérée de  $x^{(k)}$  et de la valeur donnée par l'expression (3.12). Plus précisément, pour  $\omega \in (0, 1]$  on pose

$$x^{(k+1)} = (1 - \omega)x^{(k)} + \omega [D^{-1}(E + L)x^{(k)} + D^{-1}b]. \quad (3.14)$$

Ce choix correspond à la méthode de surrelaxation JOR (*Jacobi Over-Relaxation*). La matrice d'itération correspondante est

$$B_{\text{JOR}} = (1 - \omega)I_n + \omega B_J. \quad (3.15)$$

**Lemme 3.6** (Convergence de la méthode JOR). *Si  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,n}$  est SDP la méthode JOR converge pour toute estimée initiale  $x_0$  si et seulement si le paramètre  $\omega \in (0, 1]$  satisfait la condition suivante :*

$$0 < \omega < \frac{2}{\rho(D^{-1}A)}.$$

*Démonstration.* On a

$$B_{\text{JOR}} = I_n - \omega D^{-1}D + \omega D^{-1}(E + L) = I_n - \omega D^{-1}A.$$

Comme  $A$  est SDP,  $a_{kk} > 0$  pour tout  $1 \leq k \leq n$  et  $(D^{-1})_{kk} = 1/a_{kk} > 0$ , c.-à-d.,  $D^{-1}$  est définie positive. En utilisant le résultat de l'Exercice 1.56, on peut conclure que

$$\text{Sp}(B_{\text{JOR}}) = \text{Sp}(I_n - \omega D^{-1}A) = \{1 - \omega\lambda : \lambda \in \text{Sp}(D^{-1}A)\}.$$

Par conséquent,

$$\rho(I_n - \omega D^{-1}A) = \max_{\lambda \in \text{Sp}(D^{-1}A)} |1 - \omega\lambda|.$$

La condition (3.10) est donc vérifiée si  $\omega \in (0, 1]$  est tel que

$$\left( \forall \lambda \in \text{Sp}(D^{-1}A), \quad |1 - \omega\lambda| < 1 \right) \iff \left( \forall \lambda \in \text{Sp}(D^{-1}A), \quad \omega < \frac{2}{\lambda} \right) \iff \omega < \frac{2}{\rho(D^{-1}A)}. \quad \square$$

La *méthode de Gauss–Seidel* consiste à choisir  $P = D - L$  et  $N = E$ . A l'itération  $k + 1$  la mise à jour est effectuée en posant

$$x^{(k+1)} = (D - L)^{-1}E x^{(k)} + (D - L)^{-1}b. \quad (3.16)$$

La matrice d'itération correspondante est

$$B_{\text{GS}} = (D - L)^{-1}E.$$

Dans ce cas aussi on peut pondérer la valeur (3.16) par  $x^{(k)}$ , obtenant ainsi la méthode SOR (*Successive Over-Relaxation*). La mise à jour à l'itération  $k + 1$  revient donc à poser pour  $\omega \in (0, 1)$ ,

$$x^{(k+1)} = (1 - \omega)x^{(k)} + \omega[(D - L)^{-1}E x^{(k)} + (D - L)^{-1}b]. \quad (3.17)$$

La matrice d'itération correspondante est

$$B_{\text{SOR}} = (1 - \omega)I_n + \omega B_{\text{GS}}.$$

### 3.1.3 La méthode du gradient

Le dernier algorithme de point fixe que nous allons examiner admet une interprétation qui permet de dépasser le cadre de la résolution de systèmes linéaires, et qui le rend applicable à des problèmes plus généraux d'optimisation. Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice SDP. On définit la fonctionnelle quadratique  $J : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  telle que

$$J(y) := \frac{1}{2}y^T A y - b^T y, \quad (3.18)$$

en on considère le problème de minimisation libre

$$\min_{y \in \mathbb{R}^n} J(y).$$

On peut prouver que ce problème admet une et une seule solution  $x \in \mathbb{R}^n$  (dite *minimiseur global* de  $J$  sur  $\mathbb{R}^n$ ) telle que

$$J(x) \leq J(y) \quad \forall y \in \mathbb{R}^n,$$

et caractérisée par

$$\nabla J(x) = Ax - b = 0 \in \mathbb{R}^n.$$

Ce résultat est précisé dans le lemme suivant.

**Lemme 3.7** (Minimisation d'une fonctionnelle quadratique et systèmes linéaires). Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice SDP. Alors, pour tout  $b \in \mathbb{R}^n$ ,

$$Ax = b \iff J(x) = \min_{y \in \mathbb{R}^n} J(y).$$

*Démonstration.* Pour tout  $y, z \in \mathbb{R}^n$  et tout  $t \in \mathbb{R}$  on a

$$\begin{aligned} J(z + ty) &= \frac{1}{2}(z + ty)^T A(z + ty) - b^T(z + ty) \\ &= \frac{1}{2}z^T A z - b^T z + \frac{t}{2}(z^T A y + y^T A z) + \frac{t^2}{2}y^T A y - t b^T y && \text{Proposition 1.7} \quad (3.19) \\ &= \underbrace{\frac{1}{2}z^T A z - b^T z}_{=J(z)} + \frac{t}{2}(z^T A y + y^T A z) + \frac{t^2}{2}y^T A y - t b^T y \\ &= J(z) + t y^T (A z - b) + \frac{t^2}{2}y^T A y. && \text{Symétrie de } A \end{aligned}$$

**(i) Implication**  $J(x) = \min_{y \in \mathbb{R}^n} J(y) \implies Ax = b$ . Puisque  $x$  est minimiseur global de  $J$ , l'identité (3.19) avec  $z = x$  implique, pour tout  $t \in \mathbb{R}$  et tout  $y \in \mathbb{R}^n$ ,

$$J(x + ty) \geq J(x) \iff t y^T (Ax - b) + \frac{t^2}{2}y^T A y \geq 0.$$

En prenant  $t > 0$ , en divisant par  $t$ , et en faisant tendre  $t \rightarrow 0^+$  il vient  $y^T (Ax - b) \geq 0$ , d'où  $Ax - b = 0 \in \mathbb{R}^n$  car  $y \in \mathbb{R}^n$  est générique.

**(ii) Implication**  $Ax = b \implies J(x) = \min_{y \in \mathbb{R}^n} J(y)$ . Pour tout  $w \in \mathbb{R}^n$ , en utilisant encore l'identité (3.19) avec  $z = x$ ,  $t = 1$ , et  $y = w - x$  il vient

$$J(w) = J(x) + t(w - x)^T \underbrace{(Ax - b)}_{=0 \in \mathbb{R}^n} + \frac{1}{2}(w - x)^T A(w - x).$$

La matrice  $A$  étant SDP, le dernier terme du membre de droite est non négatif (positif si  $w \neq x$ ). Par suite,  $x$  est minimiseur global de  $J$  sur  $V$ .  $\square$

L'idée de la *méthode du gradient* se base sur la remarque suivante : pour tout  $y \in \mathbb{R}^n$  avec  $\nabla J(y) \neq 0$ , on peut réduire *au moins localement* la valeur de  $J(y)$  en se déplaçant dans la direction  $-\nabla J(y)$ . En effet,  $\nabla J(y)$  correspond à la direction de plus grande pente (positive) de  $J$  en  $y$ . Fixons une estimation initiale  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ . Pour  $k \geq 1$  et jusqu'à convergence on pose

$$r^{(k)} := -\nabla J(x^{(k)}) = b - Ax^{(k)}, \quad x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha r^{(k)},$$

où le réel  $\alpha > 0$  est lié au module du déplacement dans la direction de la plus profonde descente. La direction de descente  $r^{(k)}$  est le *résidu* du système linéaire correspondant à l'approximation  $x^{(k)}$  (on a  $r^{(k)} = 0$  si  $x^{(k)} = x$ ).

On peut ensuite se demander de combien faut-il avancer dans la direction  $r^{(k)}$ . Pour répondre à cette question, on cherche à reformuler la méthode du gradient sous la forme (3.4). On a

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha(b - Ax^{(k)}) = (I_n - \alpha A)x^{(k)} + \alpha b =: B_G x^{(k)} + f_G.$$

Afin de maximiser la vitesse de convergence (c.-à-d., réduire le plus possible l'erreur à chaque itération), le paramètre  $\alpha$  doit être choisi de façon à minimiser le rayon spectral de la matrice d'itération  $B_G$ , comme le montre le lemme suivant.


**Lemme 3.8** (Vitesse de convergence de la méthode du gradient). *Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  SDP et on note respectivement  $\lambda_{\max}$  et  $\lambda_{\min}$  la plus grande et la plus petite valeur propre de  $A$ . En choisissant  $\alpha = \frac{2}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}}$ , la méthode du gradient converge pour toute estimation initiale  $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$  et on a pour  $k \geq 1$ ,*

$$\|e^{(k+1)}\|_2 \leq \frac{\text{cond}_2(A) - 1}{\text{cond}_2(A) + 1} \|e^{(k)}\|_2.$$

*Démonstration.* On a par définition

$$\text{Sp}(B_G) = 1 - \alpha \text{Sp}(A) \implies \rho(B_G) = \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |1 - \alpha \lambda|.$$

Le graphe de la fonction  $\varphi(\alpha) := \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |1 - \alpha \lambda|$  est représenté en trait plein dans la figure suivante.



Le minimum de  $\varphi(\alpha)$  est donc atteint pour  $\alpha$  tel que  $|1 - \alpha \lambda_{\min}| = |1 - \alpha \lambda_{\max}|$ , à savoir,  $\alpha = \frac{2}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}}$ . De plus, on a

$$\varphi\left(\frac{2}{\lambda_{\min} + \lambda_{\max}}\right) = \rho(B_G) = \frac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}} = \frac{\lambda_{\min}(\text{cond}_2(A) - 1)}{\lambda_{\min}(\text{cond}_2(A) + 1)} < 1,$$

où nous avons utilisé (2.2) et le fait que  $A$  est SDP pour conclure  $\text{cond}_2(A) = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ . Par conséquent, avec le choix proposé pour  $\alpha$ , nous avons  $\rho(B_G) < 1$ . Comme la méthode est consistante, ceci implique sa convergence pour tout choix initial (voir la discussion à la fin de la Section 3.1.1 à ce sujet).

Passant à la norme  $\|\cdot\|_2$  dans (3.9), on trouve pour tout  $k \geq 0$ ,

$$\|e^{(k+1)}\|_2 = \|B_G e^{(k)}\|_2 \leq \|B_G\|_2 \|e^{(k)}\|_2 = \rho(B_G) \|e^{(k)}\|_2,$$

où nous avons utilisé la Proposition 1.47 dans la majoration et le Corollaire 1.42 pour écrire  $\|B_G\|_2 = \rho(B_G)$ . □

**Exemple 3.9** (Convergence lente de la méthode du gradient). *Le Lemme 3.8 montre que convergence de la méthode du gradient peut devenir lente lorsque la matrice  $A$  est mal conditionnée : lorsque  $\text{cond}_2 A$  est grand, on a en effet  $\rho(B_G) = \frac{\text{cond}_2(A) - 1}{\text{cond}_2(A) + 1} \approx 1$ .*

Le choix du paramètre d'accélération  $\alpha$  suggéré par le Lemme 3.8 est souvent remplacé en pratique par d'autres expressions plus simples à calculer. Un choix qui est *localement optimal* est obtenu en posant, à chaque itération  $k$ ,  $\alpha = \alpha^{(k)}$  avec  $\alpha^{(k)}$  unique solution du problème de minimisation suivant :

$$\min_{\alpha \in \mathbb{R}} \{J(x^{(k+1)}) = J(x^{(k)} + \alpha r^{(k)})\}. \quad (3.20)$$

On peut montrer (voir Exercice 3.19) que la solution de ce problème est

$$\alpha^{(k)} = \frac{\|r^{(k)}\|_2^2}{\|r^{(k)}\|_A^2}. \quad (3.21)$$

## 3.2 Méthode du gradient conjugué

Comme nous l'avons vu dans la section précédente, la méthode du gradient devient assez inefficace lorsque la matrice est mal conditionnée. Le problème vient du fait que la direction de descente est choisie en utilisant uniquement des informations locales. L'idée des méthodes considérées dans cette section consiste à se déplacer dans une direction obtenue *en tenant compte des directions déjà explorées au cours des itérations précédentes*.

### 3.2.1 Vecteurs $A$ -conjugués

**Définition 3.10** (Vecteurs  $A$ -conjugués). Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice SDP. Deux vecteurs non nuls  $x, y \in \mathbb{R}^n$  sont dits  $A$ -conjugués si  $y^T A x = x^T A y = 0$ . Une famille  $(x_i)_{1 \leq i \leq p}$  de vecteurs de  $\mathbb{R}^n$  non nuls est dite  $A$ -conjuguée si

$$\forall 1 \leq i, j \leq p \quad (i \neq j \implies x_i^T A x_j = x_j^T A x_i = 0).$$

**Lemme 3.11** (Famille de vecteurs  $A$ -conjuguée). Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice SDP et  $\mathcal{F} := (x_i)_{1 \leq i \leq p}$ , une famille de vecteurs  $A$ -conjuguée. Alors  $\mathcal{F}$  est libre et  $p \leq n$ . Si  $p = n$ , alors  $\mathcal{F}$  est une base de  $\mathbb{R}^n$ .

*Démonstration.* On cherche les combinaisons linéaires des vecteurs de  $\mathcal{F}$  telles que

$$\sum_{j=1}^p \lambda_j x_j = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p = 0 \quad \text{avec} \quad \lambda_j \in \mathbb{R} \quad \forall 1 \leq j \leq p.$$

Soit  $1 \leq i \leq p$ . En multipliant à gauche par  $x_i^T A$  l'égalité ci-dessus on obtient

$$x_i^T A \sum_{j=1}^p \lambda_j x_j = \sum_{j=1}^p \lambda_j x_i^T A x_j = \lambda_i \|x_i\|_A^2 = 0.$$

Comme  $x_i \neq 0$  par définition, ceci implique  $\lambda_i = 0$ , à savoir, la famille  $\mathcal{F}$  est libre et, par conséquent,  $p \leq n$ . Si  $p = n$  on a une famille libre de cardinalité égale à la dimension de l'espace  $\mathbb{R}^n$ , et il s'agit donc d'une base de cet espace.  $\square$

### 3.2.2 La méthode du gradient conjugué

Une méthode qui utilise des directions conjuguées est dite *conjuguée*. Nous allons montrer dans cette section comment construire une méthode conjuguée pour la solution du système linéaire (3.1) avec  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  SDP. Par brévit  dans ce qui suit on notera  $(\cdot, \cdot)$  le produit scalaire canonique de  $\mathbb{R}^n$  et on posera  $(\cdot, \cdot)_A := (A\cdot, \cdot)$  et  $\|v\|_A := \sqrt{(v, v)_A}$  pour tout  $v \in \mathbb{R}^n$ . Soit  $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$  une estimation initial de la solution et d finissons le r sidu  $r^{(0)} := b - Ax^{(0)}$ . Les directions de descente  $w^{(k)}$ ,  $k = 0, \dots$  sont obtenues comme suit :  $w^{(0)} = r^{(0)}$  et

$$w^{(k)} = r^{(k)} - \beta^{(k)} w^{(k-1)} \quad k = 1, \dots \quad \text{avec } \beta^{(k)} \in \mathbb{R} \text{   pr ciser.} \quad (3.22)$$

Une fois identifi e une direction  $w^{(k)}$  appropri e, la mise   jour de la solution se fait en posant

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{(k+1)} w^{(k)} \quad \text{avec } \alpha^{(k+1)} \in \mathbb{R} \text{   pr ciser.} \quad (3.23)$$

Ceci implique, en particulier,

$$r^{(k+1)} = b - Ax^{(k+1)} = b - Ax^{(k)} - \alpha^{(k+1)} Aw^{(k)} = r^{(k)} - \alpha^{(k+1)} Aw^{(k)}. \quad (3.24)$$

Pour d terminer les r els  $\alpha^{(k)}$  et  $\beta^{(k)}$  nous demandons   ce que, pour tout  $0 \leq j \leq k-1$ ,

$$(w^{(k)}, w^{(j)})_A = 0, \quad (\text{CG1})$$

$$(r^{(k)}, w^{(j)}) = 0. \quad (\text{CG2})$$

Les conditions (CG1) et (CG2) correspondent   la m thode du *gradient conjugu * (CG) et expriment le fait que la nouvelle direction  $w^{(k)}$  et le r sidu  $r^{(k)}$  sont respectivement A-orthogonale et orthogonal aux directions pr c dentes. Ces deux conditions montrent une caract ristique importante de la m thode CG : la mise   jour n'est pas uniquement bas e sur une information locale (direction de plus grande pente), mais elle tient compte  galement des it rations pr c dentes. Comme on le verra plus loin, on peut assurer les deux conditions (CG1)–(CG2) *sans m moriser* les directions  $w^{(j)}$ ,  $1 \leq j < k-1$ . Ce point est tr s important en pratique, car il implique que la mise en  uvre de la m thode CG ne demande pas significativement plus de m moire que les autres m thodes it ratives que l'on a  tudi  jusqu'  l .

Le lemme suivant montre de fa on constructive l'existence d'une famille de directions de descente  $(w^{(k)})_{k=0, \dots}$  qui remplissent les conditions (CG1)–(CG2) et permet de pr ciser l'expression des param tres  $\alpha^{(k)}$  et  $\beta^{(k)}$ .

**Lemme 3.12** (Existence des directions  $(w^{(k)})_{k=0, \dots}$ ). *Pour tout  $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$  il existe des valeurs des param tres  $\alpha^{(k)}$  et  $\beta^{(k)}$ ,  $k = 1, \dots$ , et une famille de vecteurs  $(w^{(k)})_{k=0, \dots}$  telle que les conditions (CG1)–(CG2) sont satisfaites pour l'it ration d finie par (3.22) et (3.23).*

*D monstration.* La preuve proc de par r currence.

**(i) Preuve du r sultat pour  $k = 1$ .** Soit  $r^{(0)} := b - Ax^{(0)}$  le r sidu correspondant   l'estimation initiale. Si  $r^{(0)} = 0$ ,  $x^{(0)} = x$  et nous n'avons rien de plus   faire. Si  $r^{(0)} \neq 0$ , posons

$w^{(0)} = r^{(0)}$ . La nouvelle estimation de la solution est  $x^{(1)} = x^{(0)} + \alpha^{(1)} w^{(0)}$ , avec  $\alpha^{(1)}$  choisi de tel sorte à assurer la condition (CG2). De par (3.24) on a

$$0 = (w^{(0)}, r^{(1)}) = (r^{(0)}, r^{(0)} - \alpha^{(1)} Aw^{(0)}) = \|r^{(0)}\|_2^2 - \alpha^{(1)} \|w^{(0)}\|_A^2 \iff \boxed{\alpha^{(1)} = \frac{(w^{(0)}, r^{(0)})}{\|w^{(0)}\|_A^2}}.$$

La direction de descente suivante est donnée par la formule

$$w^{(1)} = r^{(1)} - \beta^{(1)} w^{(0)},$$

avec  $\beta^{(1)}$  tel que (CG1) soit vérifiée, c.-à-d.,

$$0 = (w^{(0)}, w^{(1)})_A = (w^{(0)}, r^{(1)} - \beta^{(1)} w^{(0)})_A \iff \boxed{\beta^{(1)} = \frac{(w^{(0)}, r^{(1)})_A}{\|w^{(0)}\|_A^2}}.$$

**(ii) Preuve du résultat pour l'indice  $k + 1$  en le supposant vrai pour l'indice  $k$ .** Supposons maintenant (CG1)–(CG2) vérifiées pour  $k \geq 1$  et prouvons l'existence de  $\alpha^{(k+1)}$ ,  $\beta^{(k+1)}$  et  $w^{(k+1)}$  tels les deux conditions restent vraies. En utilisant l'expression (3.24) pour  $r^{(k+1)}$  on a

$$(w^{(k)}, r^{(k+1)}) = (w^{(k)}, r^{(k)} - \alpha^{(k+1)} Aw^{(k)}) = (w^{(k)}, r^{(k)}) - \alpha^{(k+1)} \|w^{(k)}\|_A^2,$$

à savoir, (CG2) pour  $j = k$  est vérifiée pour

$$\boxed{\alpha^{(k+1)} = \frac{(w^{(k)}, r^{(k)})}{\|w^{(k)}\|_A^2}}. \quad (3.25)$$

Prouvons maintenant (CG2) pour tout  $0 \leq j \leq k - 1$ . Il suffit d'observer que, pour tout  $0 \leq j \leq k - 1$ ,

$$\begin{aligned} (w^{(j)}, r^{(k+1)}) &= (w^{(j)}, r^{(k)} - \alpha^{(k+1)} Aw^{(k)}) && \text{Éq. (3.24)} \\ &= (w^{(j)}, r^{(k)}) - \alpha^{(k+1)} (w^{(j)}, w^{(k)})_A = 0. && \text{Récurrence (CG1)–(CG2)} \end{aligned}$$

Venons maintenant à (CG1). Nous avons

$$\begin{aligned} (w^{(k)}, w^{(k+1)})_A &= (w^{(k)}, r^{(k+1)} - \beta^{(k+1)} w^{(k)})_A && \text{Éq. (3.22)} \\ &= (w^{(k)}, r^{(k+1)})_A - \beta^{(k+1)} \|w^{(k)}\|_A^2, \end{aligned}$$

et (CG1) pour  $j = k$  est donc vérifiée pour

$$\boxed{\beta^{(k+1)} = \frac{(w^{(k)}, r^{(k+1)})_A}{\|w^{(k)}\|_A^2}}.$$

Il ne reste plus qu'à prouver (CG1) pour  $0 \leq j \leq k - 1$ . Puisque  $w^{(0)} = r^{(0)}$  et chaque nouvelle direction  $w^{(k)}$  est obtenue à partir de  $r^{(k)}$  et des directions  $w^{(j)}$ ,  $0 \leq j \leq k - 1$ , on a

$$V_{k+1} := \text{span}(w^{(0)}, \dots, w^{(k)}) = \text{span}(r^{(0)}, \dots, r^{(k)}).$$



La condition (CG2) pour  $0 \leq j \leq k$  se traduit comme suit :

$$r^{(k+1)} \in V_{k+1}^\perp := \{w \in \mathbb{R}^n : (w, v) = 0 \quad \forall v \in V_{k+1}\}. \quad (3.26)$$

D'autre part, pour tout  $0 \leq j \leq k-1$ , on a d'après (3.24),

$$\begin{aligned} Aw^{(j)} = \frac{1}{\alpha^{(j+1)}}(r^{(j)} - r^{(j+1)}) \in V_{k+1} &\implies Aw^{(j)} \in V_{k+1} \\ &\implies (Aw^{(j)}, r^{(k+1)}) = (w^{(j)}, r^{(k+1)})_A = 0, \end{aligned} \quad (3.27)$$

où nous avons conclu grâce à (3.26). En utilisant les remarques précédentes on trouve

$$(w^{(j)}, w^{(k+1)})_A = (w^{(j)}, r^{(k+1)} - \beta^{(k+1)}w^{(k)})_A \quad (3.22)$$

$$= (Aw^{(j)}, r^{(k+1)}) - \beta^{(k+1)}(w^{(j)}, w^{(k)})_A = 0. \quad (3.27), \text{ récurrence (CG1)}$$

Ceci conclut la preuve.  $\square$

Compte tenu du lemme précédent, la méthode CG est définie comme suit : Pour une estimation initiale  $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ , poser  $r^{(0)} = b - Ax^{(0)}$ ,  $w^{(0)} = r^{(0)}$  et, pour  $k = 0, \dots$ ,

$$\alpha^{(k+1)} = \frac{(w^{(k)}, r^{(k)})}{\|w^{(k)}\|_A^2}, \quad (3.28a)$$

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{(k+1)}w^{(k)}, \quad (3.28b)$$

$$r^{(k+1)} = r^{(k)} - \alpha^{(k+1)}Aw^{(k)}, \quad (3.28c)$$

$$\beta^{(k+1)} = \frac{(w^{(k)}, r^{(k+1)})_A}{\|w^{(k)}\|_A^2}, \quad (3.28d)$$

$$w^{(k+1)} = r^{(k+1)} - \beta^{(k+1)}w^{(k)}. \quad (3.28e)$$

**Théorème 3.13** (Convergence de la méthode CG). *Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  SDP et  $b \in \mathbb{R}^n$ . La méthode CG pour la solution du système linéaire  $Ax = b$  converge en au plus  $n$  itérations.*

*Démonstration.* La famille  $\mathcal{F} := (w^{(0)}, \dots, w^{(n-1)})$  de cardinalité  $n$  est libre d'après le Lemme 3.11, et elle est donc une base de l'espace  $\mathbb{R}^n$ . Comme  $r^{(n)}$  est orthogonal à tout vecteur de  $\mathcal{F}$  on doit avoir  $r^{(n)} = 0$ , à savoir,  $x^{(n)} = x$ .  $\square$

Le Théorème 3.13 montre que la méthode du gradient conjugué n'est pas une méthode itérative au sens strict, car elle converge après un nombre fini d'itérations. Cependant, son intérêt est lié au fait que, dans de nombreux cas pratiques, le résidu décroît rapidement, et le critère  $\|r^{(k)}\| \leq \epsilon$  est vérifié après un petit nombre d'itérations. En effet, le résultat suivant montre que la valeur de la fonctionnelle  $J$  définie par (3.18) décroît à chaque itération de la méthode (de par le Lemme 3.7, on sait que résoudre le système linéaire  $Ax = b$  avec  $A$  SDP équivaut à minimiser  $J$ ). Dans le jargon de l'optimisation on dit que  $w^{(k)}$  est une *direction de descente stricte* de  $J$  en  $x^{(k-1)}$ .

**Proposition 3.14** (Monotonie des itérations CG). *Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice SDP,  $b \in \mathbb{R}^n$  et  $J$  définie par (3.18). On considère l'itération  $(k+1)$  de la méthode du gradient définie par (3.28). Alors, si  $w^{(k)} \neq 0$  et  $\alpha^{(k+1)} \neq 0$ ,*

$$J(x^{(k+1)}) < J(x^{(k)}).$$

*Si  $\alpha^{(k+1)} = 0$ ,  $x^{(k)}$  est le minimiseur de  $J$  et  $Ax^{(k)} = b$ .*

*Démonstration.* On commence par remarquer que

$$\begin{aligned} (w^{(k)}, r^{(k)}) &= (w^{(k)}, r^{(k+1)} + \alpha^{(k+1)} Aw^{(k)}) & (3.24) \\ &= \underbrace{(w^{(k)}, r^{(k+1)})}_{=0} + \alpha^{(k+1)} \|w^{(k)}\|_A^2 > 0, & (CG2) \end{aligned}$$

où l'inégalité est stricte car  $w^{(k)} \neq 0$ . Nous avons alors

$$J(x^{(k+1)}) = \frac{1}{2} (x^{(k)} + \alpha^{(k+1)} w^{(k)}, x^{(k)} + \alpha^{(k+1)} w^{(k)})_A - (b, x^{(k)} + \alpha^{(k+1)} w^{(k)}) \quad (3.18) \text{ et } (3.23)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \underbrace{(x^{(k)}, x^{(k)})_A - (b, x^{(k)})}_{=J(x^{(k)})} + \alpha^{(k+1)} \underbrace{(Ax^{(k)} - b, w^{(k)})}_{=-(r^{(k)}, w^{(k)})} + \frac{(\alpha^{(k+1)})^2}{2} \underbrace{\|w^{(k)}\|_A^2}_{=\frac{\alpha^{(k+1)}}{2}(w^{(k)}, r^{(k)})} & (3.25) \\ &= J(x^{(k)}) - \frac{\alpha^{(k+1)}}{2} (w^{(k)}, r^{(k)}) < J(x^{(k)}), \end{aligned}$$

où nous avons conclu grâce au fait que  $(w^{(k)}, r^{(k)}) > 0$  prouvé précédemment.  $\square$

Il est important de retenir que la méthode CG accompagnée d'un bon préconditionneur est la méthode de choix pour la résolution de systèmes linéaires caractérisés par une matrice SDP.

### 3.3 Exercices

**Exercice 3.15** (Matrice à diagonale dominante). Soit  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice à diagonale dominante par lignes, à savoir

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \quad \forall 1 \leq i \leq n.$$

Soit, de plus,  $b \in \mathbb{R}^n$ ,  $b \neq 0$ . Montrer que la méthode de Jacobi pour la résolution du système linéaire  $Ax = b$  est convergente.

**Exercice 3.16** (Méthode des directions alternées). Soit  $A \in \mathbb{R}^{n,n}$  une matrice SDP décomposée en  $A = A_1 + A_2$  avec  $A_1$  et  $A_2$  matrices SDP et  $b \in \mathbb{R}^n$ ,  $b \neq 0$ . Soient  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}_*^+$ . On considère la méthode itérative suivante pour résoudre le système linéaire  $Ax = b$  :

$$(I_n + \alpha_1 A_1)x^{(k+1/2)} = (I_n - \alpha_1 A_2)x^{(k)} + \alpha_1 b, \quad (3.29a)$$

$$(I_n + \alpha_2 A_2)x^{(k+1)} = (I_n - \alpha_2 A_1)x^{(k+1/2)} + \alpha_2 b. \quad (3.29b)$$

On souhaite analyser la convergence de cette méthode. A ce propos,

- (i) prouver que, pour toute matrice SDP  $M \in \mathbb{R}^{n,n}$  et tout  $\xi \in \mathbb{R}_*^+$ , la matrice  $I_n + \xi M$  est définie positive. En déduire que les matrices  $I_n + \alpha_i A_i$ ,  $i \in \{1, 2\}$ , sont définies positives;
- (ii) prouver que, étant donné  $x^{(k)}$ ,  $x^{(k+1/2)}$  et  $x^{(k+1)}$  sont uniques;
- (iii) montrer la méthode est consistante, à savoir, si  $x^{(k)} = x$ , alors  $x^{(k+1/2)} = x^{(k+1)} = x$ ;
- (iv) identifier la matrice  $B$  et le vecteur  $f$  permettant d'interpréter (3.29) comme une méthode de point fixe de la forme

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f;$$

- (v) On admettra l'estimation suivante du rayon spectrale de la matrice  $B$  trouvée au point précédent :

$$\rho(B) \leq \max_{\lambda \in \text{Sp}(A_1)} \left| \frac{1 - \alpha_2 \lambda}{1 + \alpha_1 \lambda} \right| \times \max_{\lambda \in \text{Sp}(A_2)} \left| \frac{1 - \alpha_1 \lambda}{1 + \alpha_2 \lambda} \right|. \quad (3.30)$$

Proposer une condition sur  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$  garantissant la convergence de la méthode.  $B$ .

- (i) Il suffit de prouver que  $I_n + \xi M$  est à son tour SDP. La symétrie est évidente. Soit  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $x \neq 0$ . Par définition on a

$$x^T (I_n + \xi M)x = x^T x + \xi x^T M x > 0,$$

ce qui prouve que  $I_n + \xi M$  est définie positive. Le fait que les matrices  $I_n + \alpha_i A_i$ ,  $i \in \{1, 2\}$ , sont définies positives est une conséquence immédiate.

- (ii) Comme les matrices  $I_n + \alpha_1 A_1$  et  $I_n + \alpha_2 A_2$  sont SDP par le point (i), elles sont aussi inversibles. Par conséquent, les conditions (3.29) définissent  $x^{(k+1/2)}$  et  $x^{(k+1)}$  de façon unique.

(iii) En remplaçant  $x^{(k)}$  par  $x$  dans (3.29a) on trouve

$$\begin{aligned}(I_n + \alpha_1 A_1)x^{(k+1/2)} &= x - \alpha_1 A_2 x + \alpha_1 b \\ &= x - \alpha_1(A - A_1)x + \alpha_1 b && (A_2 = A - A_1) \\ &= x + \alpha_1 A_1 x = (I_n + \alpha_1 A_1)x, && (Ax = b)\end{aligned}$$

à savoir,  $x^{(k+1/2)} = (I_n + \alpha_1 A_1)^{-1}(I_n + \alpha_1 A_1)x = x$ .

Pour prouver que  $x^{(k+1)} = x$ , on procède de façon similaire en remplaçant  $x^{(k+1/2)}$  par  $x$  dans (3.29b) :

$$\begin{aligned}(I_n + \alpha_2 A_2)x^{(k+1)} &= (I_n - \alpha_2 A_1)x + \alpha_2 b \\ &= x - \alpha_2(A - A_2)x + \alpha_2 b && (A_2 = A - A_2) \\ &= x + \alpha_2 A_2 x = (I_n + \alpha_2 A_2)x, && (Ax = b)\end{aligned}$$

et, par conséquent,  $x^{(k+1)} = (I_n + \alpha_2 A_2)^{-1}(I_n + \alpha_2 A_2)x = x$ , ce qui prouve le résultat souhaité.

(iv) De par (3.29a) on a  $x^{(k+1/2)} = (I_n + \alpha_1 A_1)^{-1}(I_n - \alpha_1 A_2)x^{(k)} + \alpha_1(I_n + \alpha_1 A_1)^{-1}b$ . En remplaçant cette expression dans (3.29b), on obtient

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f,$$

avec

$$\begin{aligned}B &:= (I_n + \alpha_2 A_2)^{-1}(I_n - \alpha_2 A_1)(I_n + \alpha_1 A_1)^{-1}(I_n - \alpha_1 A_2) \\ f &:= \alpha_1(I_n + \alpha_2 A_2)^{-1}(I_n - \alpha_2 A_1)(I_n + \alpha_1 A_1)^{-1}b + \alpha_2(I_n + \alpha_2 A_2)^{-1}b.\end{aligned}$$

La consistance de la méthode prouvée au point précédent se traduit par la relation

$$x = Bx + f.$$

(iv) En utilisant l'expression trouvée au point précédent on peut estimer l'erreur  $e^{(k)} := x^{(k)} - x$  par récurrence :

$$e^{(k)} = x^{(k)} - x = (Bx^{(k-1)} + f) - (Bx + f) = Be^{(k-1)} = B^k e^{(0)}.$$

La méthode est donc convergente si et seulement si  $\rho(B) < 1$ . Or, comme les valeurs propres de  $A_1$  et  $A_2$  sont  $> 0$ , il suffit de prendre  $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha > 0$  pour que les deux facteurs dans (3.30) soient  $< 1$  et, donc,  $\rho(B) < 1$ . Pour s'en convaincre, on résout l'inéquation en  $\alpha$  avec  $\lambda > 0$  :

$$\left| \frac{1 - \alpha\lambda}{1 + \alpha\lambda} \right| < 1.$$

Comme  $1 + \alpha\lambda > 0$ , ceci revient à résoudre

$$|1 - \alpha\lambda| < 1 + \alpha\lambda,$$

à savoir,

$$\begin{cases} 1 - \alpha\lambda < 1 + \alpha\lambda & \text{si } 0 < \alpha \leq 1/\lambda, \\ -1 + \alpha\lambda < 1 + \alpha\lambda & \text{si } \alpha > 1/\lambda. \end{cases} \iff \begin{cases} 2\alpha\lambda > 0 & \text{si } 0 < \alpha \leq 1/\lambda, \\ -1 < 1 & \text{si } \alpha > 1/\lambda, \end{cases} \iff \alpha \in \mathbb{R}_+^*,$$

ce qui montre le résultat cherché.

**Exercice 3.17** (Analyse d'une méthode itérative). Pour la résolution du système  $Ax = b$  avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix},$$

on considère la méthode itérative suivante : Pour  $k \geq 0$ ,

$$x^{(k+1)} = B(\theta)x^{(k)} + f(\theta),$$

avec  $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$  estimation initiale,  $\theta \in \mathbb{R}$ , et

$$B = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2\theta^2 + 2\theta + 1 & -2\theta^2 + 2\theta + 1 \\ -2\theta^2 + 2\theta + 1 & 2\theta^2 + 2\theta + 1 \end{pmatrix}, \quad f(\theta) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 - 2\theta \\ 1 - 2\theta \end{pmatrix}.$$

- 1) Vérifier que la méthode est consistante pour tout  $\theta \in \mathbb{R}$ , à savoir,  $x = B(\theta)x + f(\theta)$ .
- 2) Préciser ensuite pour quelles valeurs de  $\theta$  la méthode est convergente;

**1) Consistance.** La solution du système est  $x = (1, 1)^T$  et on vérifie aisément pour tout  $\theta \in \mathbb{R}$ ,

$$B(\theta)x + f(\theta) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2\theta^2 + 2\theta + 1 & -2\theta^2 + 2\theta + 1 \\ -2\theta^2 + 2\theta + 1 & 2\theta^2 + 2\theta + 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 - 2\theta \\ 1 - 2\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

ce qui prouve la consistance de la méthode.

**2) Spectre de  $B(\theta)$  et convergence.** Comme la méthode est consistante, condition nécessaire et suffisante pour que la méthode soit convergente est que  $\rho(B(\theta)) < 1$ . Calculons donc les valeurs propres de  $B$ . Il s'agit de résoudre

$$\begin{aligned} 0 = \det(B(\theta) - \lambda I_n) &= \frac{1}{4} \begin{vmatrix} 2\theta^2 + 2\theta + 1 - 4\lambda & -2\theta^2 + 2\theta + 1 \\ -2\theta^2 + 2\theta + 1 & 2\theta^2 + 2\theta + 1 - 4\lambda \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \left\{ (2\theta^2 + 2\theta + 1 - 4\lambda)^2 - (-2\theta^2 + 2\theta + 1)^2 \right\}. \end{aligned}$$

On a donc

$$2\theta^2 + 2\theta + 1 - 4\lambda = \pm(-2\theta^2 + 2\theta + 1),$$

ce qui donne comme valeurs propres

$$\lambda_{1,2} = \frac{2\theta^2 + 2\theta + 1 \pm (-2\theta^2 + 2\theta + 1)}{4} = \begin{cases} \theta + \frac{1}{2}, \\ \theta^2. \end{cases}$$

La condition  $\rho(B(\theta)) < 1$  équivaut donc à imposer

$$\max\left(\left|\theta + \frac{1}{2}\right|, \theta^2\right) < 1.$$

Or, on a que (vérifier!)

$$\max\left(\left|\theta + \frac{1}{2}\right|, \theta^2\right) = \begin{cases} \theta^2 & \text{si } \theta \leq \frac{1-\sqrt{3}}{2} \text{ ou } \theta \geq \frac{1+\sqrt{3}}{2}, \\ \left|\theta + \frac{1}{2}\right| & \text{si } \frac{1-\sqrt{3}}{2} < \theta < \frac{1+\sqrt{3}}{2}. \end{cases}$$

Donc,  $\rho(B(\theta)) < 1$  si et seulement si  $\theta \in \left(-1, \frac{1}{2}\right)$ .




FIGURE 3.1 – Graphe de la fonction  $\varrho(B(\theta))$ .

**Exercice 3.18** (Forte convexité d'une fonctionnelle quadratique). *Montrer que la fonctionnelle  $J$  définie par (3.18) est fortement convexe, à savoir, il existe  $\eta \in \mathbb{R}_*^+$  tel que, pour tout  $x, y \in \mathbb{R}^n$  et tout  $\vartheta \in [0, 1]$ ,*

$$J(\vartheta x + (1-\vartheta)y) \leq \vartheta J(x) + (1-\vartheta)J(y) - \eta \frac{\vartheta(1-\vartheta)}{2} \|x - y\|^2. \quad (3.31)$$

Préciser la valeur de  $\eta$ .

On a

$$\begin{aligned} J(\vartheta x + (1-\vartheta)y) &= \frac{1}{2}(\vartheta x + (1-\vartheta)y)^T A(\vartheta x + (1-\vartheta)y) - b^T(\vartheta x + (1-\vartheta)y) \\ &= \frac{\vartheta^2}{2} x^T A x + \frac{(1-\vartheta)^2}{2} y^T A y + \vartheta(1-\vartheta)y^T A x - \vartheta b^T x - (1-\vartheta)b^T y, \end{aligned}$$

où nous avons utilisé la symétrie de  $A$  pour conclure  $x^T A y = y^T A x$ . Pour le troisième terme au second membre on observera que

$$y^T A x = \frac{1}{2} x^T A x + \frac{1}{2} y^T A y - (y-x)^T A (y-x).$$

En remplaçant on obtient

$$J(\vartheta x + (1-\vartheta)y) = \vartheta J(x) + (1-\vartheta)J(y) - \frac{\vartheta(1-\vartheta)}{2} (x-y)^T A (x-y). \quad (3.32)$$

Or, en notant  $\lambda_{\min}(A) > 0$  la plus petite valeur propre de  $A$ , nous avons pour tout  $z \in \mathbb{R}^n$ ,

$$z^T A z \geq \lambda_{\min}(A) \|z\|^2 \iff -z^T A z \leq -\lambda_{\min}(A) \|z\|^2.$$

L'inégalité ci-dessus pour  $z = y - x$  donne finalement

$$J(\vartheta x + (1-\vartheta)y) \leq \vartheta J(x) + (1-\vartheta)J(y) - \lambda_{\min}(A) \frac{(1-\vartheta)\vartheta}{2} \|x - y\|^2,$$

qui est (3.31) avec  $\eta = \lambda_{\min}(A)$ .

**Exercice 3.19** (Paramètre d'accélération pour la méthode du gradient). *Le but de cet exercice est de prouver la formule (3.21). Soit  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par  $\varphi(\alpha) := J(x^{(k)} + \alpha r^{(k)})$ . Le problème (3.20) équivaut à*

$$\min_{\alpha \in \mathbb{R}} \varphi(\alpha).$$

*Prouver que  $\varphi$  est fortement convexe, à savoir, il existe  $\eta \in \mathbb{R}_*^+$  tel que pour tout  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  et tout  $\vartheta \in [0, 1]$ ,*

$$\varphi(\vartheta\alpha + (1-\vartheta)\beta) \leq \vartheta\varphi(\alpha) + (1-\vartheta)\varphi(\beta) - \eta \frac{\vartheta(1-\vartheta)}{2} |\alpha - \beta|^2.$$

*La forte convexité de  $\varphi$  assure que le problème (3.20) admet unique solution  $\alpha^{(k)}$  caractérisée par la propriété suivante :*

$$\varphi'(\alpha^{(k)}) = 0.$$

*Montrer que cette propriété équivaut à (3.21).*

Par brévit , on note  $(\cdot, \cdot)$  le produit interne canonique de  $\mathbb{R}^n$  et on pose  $(\cdot, \cdot)_A := (A\cdot, \cdot)$ . On commence par prouver la forte convexit  de  $\varphi$ . On a

$$\begin{aligned} \varphi(\vartheta\alpha + (1-\vartheta)\beta) &= J(x^{(k)} + (\vartheta\alpha + (1-\vartheta)\beta)r^{(k)}) \\ &= J(\vartheta x^{(k)} + (1-\vartheta)x^{(k)} + (\vartheta\alpha + (1-\vartheta)\beta)r^{(k)}) \\ &= J(\vartheta w_\alpha + (1-\vartheta)w_\beta) && (w_\xi := x^{(k)} + \xi r^{(k)}) \\ &= \vartheta J(w_\alpha) + (1-\vartheta)J(w_\beta) - \frac{\vartheta(1-\vartheta)}{2} \|w_\alpha - w_\beta\|_A^2 && \text{Eq. (3.32)} \\ &= \vartheta\varphi(\alpha) + (1-\vartheta)\varphi(\beta) - \|r^{(k)}\|_A^2 \frac{\vartheta(1-\vartheta)}{2} |\alpha - \beta|^2, \end{aligned}$$

et  $\varphi$  est donc fortement convexe de param tre  $\eta = \|r^{(k)}\|_A^2$ . Calculons maintenant la d riv e de  $\varphi$ . Nous avons

$$\begin{aligned} \varphi'(\alpha) &= \left\{ \frac{1}{2} (x^{(k)} + \alpha r^{(k)}, x^{(k)} + \alpha r^{(k)})_A - (b, x^{(k)} + \alpha r^{(k)}) \right\}' \\ &= (r^{(k)}, x^{(k)} + \alpha r^{(k)})_A - (b, r^{(k)}) \\ &= (Ax^{(k)}, r^{(k)}) + \alpha \|r^{(k)}\|_A^2 - (b, r^{(k)}) \\ &= -(b - Ax^{(k)}, r^{(k)}) + \alpha \|r^{(k)}\|_A^2 \\ &= -(r^{(k)}, r^{(k)}) + \alpha \|r^{(k)}\|_A^2 && (r^{(k)} = b - Ax^{(k)}) \\ &= -\|r^{(k)}\|^2 + \alpha \|r^{(k)}\|_A^2. \end{aligned}$$

Par cons quent  $\varphi'(\alpha) = 0 \iff \alpha = \frac{\|r^{(k)}\|_2^2}{\|r^{(k)}\|_A^2}$ , ce qui prouve (3.21).

**Exercice 3.20** (M thode du gradient conjugu ). *Utiliser la m thode CG avec donn e initiale  $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$  pour r soudre le syst me lin aire  $Ax = b$  avec*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Par brévit  on note  $(\cdot, \cdot)$  le produit interne canonique de  $\mathbb{R}^n$  et  $(\cdot, \cdot)_A = (A\cdot, \cdot)$ . On a  $r^{(0)} = w^{(0)} = (-1, 2, -1)^T$  et

$$\alpha^{(1)} = \frac{3}{10}, \quad x^{(1)} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad r^{(1)} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta^{(1)} = -\frac{1}{50}, \quad w^{(1)} = \frac{1}{50} \begin{pmatrix} 9 \\ 12 \\ 9 \end{pmatrix},$$

$$\alpha^{(2)} = \frac{5}{3}, \quad x^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad r^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La m thode a donc converg    la deuxi me it ration.

**Exercice 3.21** (Param tre d'acc l ration pour la m thode CG). *Avec les techniques de l'Exercice 3.19 montrer que le choix (3.25) minimise la fonctionnelle (3.18) pour des arguments de la forme  $x^{(k)} + \alpha w^{(k)}$  (avec  $x^{(k)}$  et  $w^{(k)}$  fix s).*

**Exercice 3.22** (Mise en  uvre efficace de la m thode CG). *On se place   l'it ration  $k$  de la m thode CG et on suppose  $\alpha^{(k+1)} \neq 0$ . Prouver la formule r cursive suivante, dont l'int r t est d' viter le produit matrice-vecteur  $Aw^{(k)}$  pour le calcul de  $r^{(k+1)}$  (voir la formule (3.24)) :*

$$r^{(k+1)} = -\alpha^{(k+1)} Ar^{(k)} + \alpha^{(k+1)} \left( \frac{1}{\alpha^{(k+1)}} - \frac{\beta^{(k)}}{\alpha^{(k)}} \right) r^{(k)} + \alpha^{(k+1)} \frac{\beta^{(k)}}{\alpha^{(k)}} r^{(k-1)}.$$

*On pourra remarquer que le r sultat du produit matrice-vecteur  $Ar^{(k)}$  peut  tre obtenu sans c t additionnel en mettant en  uvre de mani re opportune l' tape (3.28d).*



# Bibliographie

- [1] G. Allaire. *Analyse numérique et optimisation*. Éditions de l'École Polytechnique, Palaiseau, 2009.
- [2] P. G. Ciarlet, B. Miara, and J. M. Thomas. *Exercices d'analyse numérique matricielle et d'optimisation*. Masson, Paris, 2<sup>e</sup> édition, 1986.
- [3] A. Ern. Calcul scientifique. Lecture notes, 2010.
- [4] L. Formaggia, F. Saleri, and A. Veneziani. *Solving numerical PDEs : Problems, applications, exercises*. Springer, Milan, 2012.
- [5] A. S. Householder. *The theory of matrices in numerical analysis*. Dover, 2006. Originally published in 1964 by the Blaisdell Publishing Company, New York.
- [6] A. Quarteroni, R. Sacco, and F. Saleri. *Numerical mathematics*. Texts in Applied Mathematics. Springer, New York, 2000.