

Feuille d'exercices n° 2

Sous-groupes distingués

Exercice 1. Prouver les affirmations suivantes concernant un groupe G .

- (1) Soient $H \triangleleft G$ et $K \triangleleft G$. Alors $H \cap K \triangleleft G$.
- (2) Si $H < G$ et $K \triangleleft G$, alors $H \cap K \triangleleft H$.
- (3) Si G est abélien et $H \triangleleft G$, alors G/H est abélien.
- (4) Si G est cyclique et $H \triangleleft G$, alors G/H est cyclique.

Exercice 2. Soit G un groupe et H un sous-groupe.

- (1) On suppose $H \triangleleft G$. Montrer que pour tout G -ensemble X , le sous-ensemble X^H est stable par l'action de G .
- (2) Réciproquement : Montrer que si $(G/H)^H$ est stable par l'action de G , alors $H \triangleleft G$.

Exercice 3. Soient G et G' des groupes. Soient $H \triangleleft G$ et $H' \triangleleft G'$. Montrer que $H \times H' \triangleleft G \times G'$ et construire un isomorphisme

$$\phi : \frac{G \times G'}{H \times H'} \longrightarrow \frac{G}{H} \times \frac{G'}{H'}.$$

Exercice 4. Soit G un groupe, H un sous-groupe de G et K un sous-groupe de H . Donner un exemple où $K \triangleleft H$ et $H \triangleleft G$, mais K n'est pas distingué dans G .

Exercice 5 (Groupes projectifs linéaires). Soit \mathbf{K} un corps, et n un entier strictement positif. Dans la suite, en parlant d'un groupe linéaire général ou spécial, on omettra la référence à \mathbf{K} .

- (1) On désigne par $Z < \mathrm{GL}_n$ le sous-groupe des multiples non-nuls de la matrice identité. Montrer que $Z \triangleleft \mathrm{GL}_n$ et $Z \cap \mathrm{SL}_n \triangleleft \mathrm{SL}_n$. Montrer que $Z \cap \mathrm{SL}_n$ est fini et calculer le cardinal de $Z \cap \mathrm{SL}_n$ dans le cas $\mathbf{K} = \mathbf{C}$.
- (2) Soient PGL_n et PSL_n les quotients GL_n/Z et $\mathrm{SL}_n/Z \cap \mathrm{SL}_n$. (Ils sont respectivement un groupe linéaire projectif et linéaire projectif spécial.) Utiliser la projection canonique $\pi : \mathrm{GL}_n \rightarrow \mathrm{PGL}_n$ pour construire un isomorphisme entre PSL_n et un sous-groupe distingué de PGL_n . On identifiera PSL_n avec son image dans PGL_n .

(3) Montrer que $\mathrm{PGL}_n/\mathrm{PSL}_n \simeq (\mathbf{K}^*)/(\mathbf{K}^*)^n$ en étudiant le morphisme composé

$$\mathrm{GL}_n \xrightarrow{\det} \mathbf{K}^* \xrightarrow{\text{canonique}} \mathbf{K}^*/(\mathbf{K}^*)^n.$$

En déduire que $\mathrm{PSL}_n(\mathbf{C}) = \mathrm{PGL}_n(\mathbf{C})$ mais que l'inclusion $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{R}) \rightarrow \mathrm{PGL}_2(\mathbf{R})$ n'est pas un isomorphisme.

Exercice 6. Soit $p > 0$ un premier et n un entier strictement positif.

(1) Calculer le cardinal des groupes $\mathrm{SL}_n(\mathbf{F}_p)$ et $\mathrm{PGL}_n(\mathbf{F}_p)$ en fonction de p et n . calculer aussi le cardinal de $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_p)$. (Le calculs du cardinal de $\mathrm{PSL}_n(\mathbf{F}_p)$ est plus complexe.)

Indication : On pourra utiliser le calcul déjà fait

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbf{F}_p)| = \prod_{i=0}^{n-1} (p^n - p^i) = p^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=0}^{n-1} (p^{n-i} - 1).$$

(2) Soit P l'ensemble des droites vectorielles de \mathbf{F}_p^2 . En considérant la pente d'une droite, montrer que $|P - \{\mathbf{F}_p \vec{e}_2\}| = p$. En déduire que $|P| = p + 1$.

(3) On suppose $p = 3$. En faisant $\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_3)$ agir sur P , montrer que $\mathrm{PGL}_2(\mathbf{F}_3) \simeq \mathcal{S}_4$ et $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{F}_3) \simeq \mathcal{A}_4$.

Exercice 7. Soit G un groupe tel que son quotient par le centre Z soit un groupe cyclique. Montrer que G est abélien. Utiliser ce résultat pour montrer que si p est un premier, alors tout groupe d'ordre p^2 est abélien.